



Medyc. pol. 3003.

Annu Inceptione
mater adultum
Hunc pater
Hole liquesce
Ex litris Stanislas
Rogowski

Ex libris c. N. Michaelis
Devonshi P. B. et P.

1886. IX. 29.

25
19

86

W. R. R. R.

42909

5



SEBASTIANI SLESZKOWSKI

Philosophiæ & Medicinæ Doctoris.

DE
FEBRIBVS
LIBER;

In quo earum causa, signa, prognoses, curatio, iuxta
doctrinam Hippocratis & Galeni Principum, alio-
rumq; posterioris etatis celebriorum, ac etiam
praxim selectam, atq; singularem, quo-
rundam huius aui expertissimorum,
Medicorum, cum breuiter, tum
sufficenter, traduntur.

Mon ſolum Medicis ad curandum; verum
etiam reliquo omni hominum gene-
ri ad præcauendum, appri-
mè utilis, ac neceſſarius.

GRACOVIA.

Typographo Stanisław Giermanski. 1612.

[illegible]

IN ARMA
GENTILITIA DOMVS
COMOROVIORVM.



A Rma hec quid dicant & magnos virtute Dynastae,
 Excelsa meritis laude sub astra vehi,
 Fortes magnanimo varijs per sepe periculis
 Pectore durarunt ritu Comoroviorum.
 Publica priuatis auxerunt commoda rebus,
 Idcirco chari Regibus, & Patrie.
 Inter quos Petrus firmus, constansq; sacrata
 Religionis amans, Martis & Artis honor.
 Excelsa virtute potens, cordatus in hostem
 Prorumpens, claret consilio, ore, manu.

PERILLVSTRI
ET MAGNIFICO
DOMINO,
D. PETRO
KOMOROWSKI

A KOMOROW
COMITI
IN LIPTOW
ET ORAVA

CAPITANEO
OSWIECIMEN.

&c. &c.
Domino suo Clementissimo,

SEBASTIANVS SLESZKOWSKI
Libens, lubensq; inscribit, & dicat.

M Agnum munus esse cen-
seo, Perillustreis Domine,
de genere humano mereri: id est,

(A) 2 multorum

EPISTOLA

multorum aliò flexas mentes ad
metam illam Publici Boni ducere,
dirigere, vnàq; cum vita, & salute,
seruare, atq; retinere. Reuera enim
in hoc vno nostra felicitas sita,
vt Publica salus salua, & integra,
constet; atq; etiam optimus quisq;
nascitur, non vt moliter sese curet,
sed vt per ipsum salutariter & publicè,
& priuatim viuatur. Cæterum dum hoc
ipsū censeo, etiam simul facio, quia ex
illa sciētia, quæ maxime bono totius
Vniuersi cōfert, scilicet, arte Medica,
præcepta vel imprimis necessaria,
atq; ex illis consilium; vsui vitæ
humanæ in publicum emitto. Non est
profectò alia supra hanc sciētia,
quia reliquæ omnes nec semper,
nec omnes in vsu: hæc necessariò omni
ordini,
sexui;

DEDICATORIA

sexui, ætati, ex quibus totum hoc
 magnū cōponitur corpus. Sua-
 for est virtutum Medicus, dum e-
 nim vitam cuiuspiam curat, pri-
 mō animum à vitiorum colluue
 expūrgat, crapulam remouet, irā,
 tristitiam, socordiam, & omnem
 luxum in omni re prohibet; sed
 etiam vitam, salutemq; cōseruat,
 dum labefactatas cordis vires re-
 ficat: cerebri spiritus fulcit, atq;
 sustentat: mentis organa perpur-
 gat: expollit ingenium, recreat
 memoriam, atq; totum corporis
 statum in meliorem commutat
 formam. Nouit enim admirādā
 rerum creatarum vim, nouit cau-
 sas morborum, & modos auertē-
 di morbos; atq; ita aut singulis
 rebus, aut varia variarum tempe-
 rie omnem ab humano genere a-

*Medicus
 perfunctus
 virtutes*

(A) 3

uertit

EPISTOLA

uertit intemperiem, aut iam ortam eradicat. Medica profectò scientia eius est virtutis,

Possit vt in cælum manes reuocare sepultos,

dum vitam iam penè extinctam in statum sanitatis pristinae reuocat. vitam ipsi debemus, & à nobis certatim stare àtquos video, qui Medicos, vt Apollinē, Aesculapium, Machaonem, Asclepiadē, & alios innumeros, quos hīc raceo,

Diuorum altaribus augent,
verùm etiam omne æuum, vetus, medium, nostrum, huic magnæ scientiæ principem ubiq; tribuit locum, & eius cultoribus præmia. Et hæc prima causa est, Perillustris Domine, ob quam ipsius scientiæ præcipuam partem illustri

DEDICATORIA.

ftri Tuo Nomini Dico; præcipuâ
 dico, quia de Febribus eam inſcri-
 bo, in eaq; cauſas Febriû, ſignâ,
 prognofes, modum curandi, ap-
 rio; qui quidem morbi omnium
 frequentiffimi, acutiſſimi, & om-
 nibus propè acutis adnexi, pluri-
 mos faciunt calcare viam lethi,
 niſi peritè ipſi calcentur, & tol-
 lantur. Addo aliam, ſcilicet, hîc
 me lucē quærere tenui luci meæ
 ab illuſtri Tuorum, Tuaq;, luce.
 Quidni? Reuera non multas in
 vniuerſo terrarum orbe Gêtes vi-
 deo, quæ cum Gente Tua, vel
 antiquitate, vel rerum geſtarum
 gloria, quæât comparari. Etenim
 alta ab origine per Comites à Li-
 ptow, & Oraua, derivatus in Te
 ſanguis natales Tuos inſtruit, &
 Gentem dignitati fatalem in in-

EPISTOLA

clyto Poloniæ Regno, per longos (quos prudens omitto) Nepotes ad Petrum Comorouium feliciter transmisit: Vir hic fuit verè magnus inter magnos, vtpote quem magnitudo animi, & prudentia, cuius vtriusq; egregium specimen dedit in publicis, iisq; arduis, negotiis; imò ipsa
ardens euexit ad æthera virtus.

Namq; dum Vngaria Casimirum Casimiri Regis Poloniæ Filium in Regē deligit, & rursus in Matthiam mentes flectit, magni Princeps animi Casimirus contemnit: in Poloniam redit, & dum nulli-
 bi propter

varios casus, & tot discrimina rerum,
 cum suis consistere non audet,
 à Petro

aliqui

f. f. f.

quem

DEDICATORIA

quem liquidus *Fortunarius* inaurat
 omni munere *Divum*,
 hospitio Gelauix multos dies,
 Rosenbergæ itidē multos, splen-
 didè, & magnificè, excipitur, atq;,
 ob hanc ipsam rem, Petrus à Mat-
 thia Rege bonis omnib⁹ exutus,
 in Polonia, ob virtutem, atq; fi-
 dem, in Casimirum, territorium
 Crasnostauien. accipit, & Ziueci-
 um per suos posteros hucusq; re-
 tinet. Magna vis sanguinis, atq; ori-
 ginis. Fertur enim cursu perenni
 fontium vena vitalis ab hoc ipso
 in Christophorum Auum Tuum
 Castellatum Oswiecimen. Quid
 hic? Magnus Toga, Sagoq; fuit,
 quia & in cōsilio id tenuit, quod
 rectum, & in bello, quod Rei-
 pub. salutare. Positus enim in fi-
 nibus Regni in vsum eius Boni

EPISTOLA

Publici excubias egit, & hostem,
quoties se obtulisset

Fudit Eques metuendus hasta.

Iam Christophorus Pater Tuus
Castellanus Sadecen. nostrum vi-
xit æuum: nouimus quantus ille
vir, nouimus prudentiam, virtu-
tes, facta, laudes exprimere non
possumus, & silemus; sed ita, vt
toto reliquo corpore velato, ca-
put ostendamus.

Hic vir, hic est Diuûm genus.

quia facta eius, atq; virtutes verè
diuinæ, ob quas in sancti⁹ Cõsili-
um, quod stat⁹, & rerû, vocât, adsci-
tus, id est, auct⁹ Senatoria dignita-
te, eâ sustinuit, cum fauore, laude,
plausu. Diuinitas quædã videtur,
& fuit profectò hæc dignitas in eo

*Nam consulta Patrum, nam le-
ges, iuraq; seruans,*

saluta-

'DEDICATORIA:

salutariter, & ex usu Publico illā
habuit. Etenim ad mentem De-
mosthenis naui Reipub. salua,
promptè consuluit, & prouidè:
quia postquam fluctus exuperat,
inane est studium. Consuluit se-
riò, & non properanter: quia fe-
stinatio est cæca. Vidimus, vide-
mus, videbimus, bona cōsilia mo-
râ valescere; maximè apud eum,
cuius consilii gubernaculum lex
diuina. Et sanè magnum in Sena-
tore, atq; vtile, munus, vt ex men-
te Solonis consulat non suauis-
sima, sed vtilissima, ille fecit; sed
tēpestiuè: quia frequēter saluberri-
ma medicina abit in perniciē data
nō opportunè; sed cōstāter: quia
vacillatio est certū signū nō certæ
mētis. Ah vtinā ipsi in his virtuti-
bus plures similes, qui gradu si-
miles!

EPISTOLA

miles! Non verear dicere, illorum ornamēto, Reipublicæ præsidio, id fore; & consultius, atq; felicius, quædam administratum iri. Taceo reliqua. quia non facile exitum reperiō, si semel penetro in hoc profundum rerum ab eo gestarum. Ad te, Perillustriſ Domine, venio, qui ab hac aurea arbore verè aureus es ramus.

Fortes creantur fortibus & bonis,
neq; Tu Tuorum Maiorum lucem imminuisti, imò auxisti, statim ab ineunte ævi flore, & magis auges. Gloriam sanè non in facili putas, iuxta illud:

Ardua per durum gloria raudit iter;

& Te ad dura iam olim à teneris exciuit. Namq; è castris Mineruæ egressus, ostendisti, fortes, & constan-

DEDICATORIA:

Constantes animos non ad quie-
tem inuitari, sed ad labores in
Republica suscipienda suscitari.
Et hinc est, quod & in Cōmuni
illo Motu Cūssili iūxisti Te gregi
tuō: id est, bonis, & Regi, pro sa-
lute Boni Publici. Comes virtuti
honos, comes Tibi, qui per tem-
plum *Virtutis* ad templum *Hō-*
noris

Quō Te cælestis sapientia duxe-
rit, ire
haud cessas, & iam ingrederis,
magisq; talis esse pergis. Præfe-
ctura enim insignitus Oswieci-
men, dignitatem hanc habes sine
iactantia, procacia, vanitate. Nam-
que vtramque illam diuam iusti-
tiam nempe, & Clementiam, rectè
sequeris. quia omnibus tribuis,
quod suum est, id est, meritis præ-
mium,

EPISTOLA

mium, noxiis panam; sed etiam
simul lenis, & temperas, etiam no-
xios eripis, lapsos erigis. Maçtè
hac mente Tua, quam adgnatam
scio nonnisi optimæ cuiq; menti,
perge in hoc tali passu fidenter:
quippe vtraq; hæc

*Est summa virtus, petitur hac ca-
lum via.*

Petis tu, Perillustri Domine quia
dignitatem Tuam ex usu Boni
Publici habes. Mehercle pro-
cul à Te rei Tuæ studium, qui re-
ctè censes res priuatas semper of-
fecisse, offecturasque, publicis: &
præcipuum veri iudicii venenū,
Reipubliceq; interitū, suā cuiq; v-
tilitatem. Iam in alta fortuna non
abripi licentiæ vêtis difficile est:
quia *inter tot obsequia Fortuna nō sa-
tis cauta mortalitas.* Non abriperis,
Perillu-

DEDICATORIA

Perillustri Domine, quia in omnibus moderationem seruas, & hac salua, insertam habes gravitatem in vultu, auctoritatem in verbis, & factis; simul etiam comitatem, & humanitatem: illas venerabiles, istas amabiles, ob quas Polonia nostra in Te duplici isto fertur affectu *Venerationis* pariter & *Amoris*. Feror & ego, quia cum iam olim multis ab hinc annis nobilissimam Domū Tuam candido amore sim complexus, illiusque singulares Perillustribus Tuis Fratribus, viris magnis, & ad magna natis, indices notas, vigilis mei laboris, & stili, exhibuerim, nunc idem facio, dum Tibi, Perillustri Domine, hunc foetum ingenii mei consacro ab hac tertia causa. Accipe itaque

EPISTOLA

itaque Perillustris Domine, qui
 bonas Musas, & cum Musis fili-
 os, aut cultores, Musarum, & ipsi-
 us Domine Sapiencie, amas, hoc
 veluti animi, cultusque mei in Te
 pignus: accipe me ipsum, & id,
 quicquid est ab ingenio meo, me-
 que contra susurros tuere, & ra-
 diis benevolentie Tue ad ma-
 iora attolle, iuua, promoue. Ego
 vires ingenii mei, in cultum, lau-
 demque Tuam, & nobilissimam
 Gentis Tue, offero. XI. Calen-
 das Martij. CIO. IDC. XVI.

F

In qu
 do

N




DE

FEBRIBVS LIBER.

*In quo earum causa, signa, prognoses, curatio, iuxta
doctrinam Hippocratis & Galeni principum, alio-
rumq; posterioris ætatis celebriorum, ac etiam
praxim selectam, atq; singularem, quo-
rundam huius æui expertissimorū,
Medicorum, cū breviter, tum
sufficienter traduntur.*



*Non solum Medicis ad curandum; verum
etiam reliquo omni hominum gene-
ri ad præcauendum, appri-
mè utilis, ac necessarius.*



AL
de
cipe, c
in lucen
aut ven
Galenus
Scilicet
O meip
ma, exc
commen
quartun
litati, c
peßim
mus, O
xus, pli

Namq;
nimirum
operatio
non sunt
sed O;
magnitu
hunc mo
RE hab



A V C T O R
L E C T O R I
S.

Alterum ingenij mei, benigne lector, scetum
de Febribus, morborū omnium morbo prin-
cipe, & comite, Deo auspice, cui omnia debeo,
in lucem emitto. Et quidem huc me non ambitio,
aut ventus nouitatis, pellexit; sed ea, quas habet
Galenus 7. Meth. meden. ad Eugenium, causa.
Scilicet hac in re & vrgentibus amicis gratificor,
& meipsum ad rem propositam, ratione vtilissi-
ma, excito, & ad obliuionem (ex mente Platonis)
commentarios mihi repono; verū etiam (vt
quartum addam) vsui, & publice omnium vti-
litati, consulo Omnis morbus malus: Febris
peßimus, quia omnium frequentissimus, acutissi-
mus, & quod maius, acutis prope omnibus adne-
xus, plurimos

mortis limen adire coëgit.

Namq; ceteri ferè omnes vnā duntaxat partem,
nimirum animalem, aut vitalem, aut naturalem,
operationem impediunt, vel ledunt: febris omnes,
non sua tantū violentia, ferocitate, malignitate,
sed & suorum symptomatum multitudine, atq;
magnitudine. Vide hic magnum, atq; vtile esse,
hunc morbum nosse, atq; curare: & in hoc OPE-
RE habes; quia de Febribus illud inscribo: id est,

AD LECTOREM.

diuersas Februm naturas, ipsarumq; causas, signa, prognoses, & modum curandi, scribo, explicando partem aetiæ, & affectum ipsum, ita ut nihil in hac materia deesse videatur: quod quidem nullum ante me ita fecisse constat. Sanè enim omnia hæc magna cum diligentia facio, quia quæ in hoc genere morbi à probatissimis auctoribus excerpti: à præceptoribus hausi: longororum usu, ac experientia, probata accepi: quæq; maxime sub hac cæli constitutione hominum degentium naturis, æuo, consuetudini, seruire obseruari, candidè absq; omni fuco, omni posteritati in hoc OPVS redigo: nihil veritus Momum, aut calumniantem, quia talibus insitum alijs clanculum obmordere, cum ipsi nihil producant in publicum usum. Non verò hic expectabis disputationes accuratas, aut exquisitam stili elegantiam, quia non inanibus verbis; vsui, prouidi, & Medicæ Ornari res ipsa negat contenta doceri. Quare, benigne lector, laborem nostrum, & quicquid est ab ipso, candidè accipe, contraq; susurros defende; sed etiam me cum hac, quæ est ab ingenio meo, prole, ama, & feliciter vale.



D E

FEBRIBVS LIBER.

In quo earum causa, signa, prognoses, curatio,
iuxta doctrinam Hippocratis & Galeni princi-
pum, aliorumq; posterioris ætatis celebriorum, ac
etiam praxim selectam, atq; singularem, quorun-
dam huius æui expertissimorum, Medicorum, cum
breuiter, tum sufficienter traduntur.

✽ ✽ ✽

Non solum Medicis ad curandum; verum
etiam reliquo omni hominū generi ad præ-
seruandum, apprimè utilis, ac
necessarius.

✽ ✽ ✽

Præfatio.



Febres iure merito primum sibi locū Febres
inter reliquos omnes corporis affe- quales
ctus vendicant. Sunt enim febres mor- morbi.
bi tum vniuersales, tum frequentissi-
mi, tum diligenter Medico considerandi.

Vniuersales quidem, quoniam non vnā aliā

M m

quam

De febr. in genere

quam partem duntaxat, quemadmodum pleraque
agritudines ceterae, affligunt, sed inuerso corpo-
ri exhibent negotium: ideo, quia actiones omnes
vitales, animales, naturales, ledere consueuerunt.
Et tandem etiam, quia natura illarum ubiq; ferè
in corpore tam intra, quàm extra venas coacer-
uari potest.

Febres praeterea sunt aliorum morborum fre-
quentissimi, tum quia vel sole per se inuadunt, vel
alijs grauissimis agritudinibus, per paucis omnino
exceptis, ceu comes indiuiduus, iunguntur. Quod
non ignorans D. Hippocrates ait, ubi nulla sit ae-
ris constitutio pestilens, qui pereunt, ferè ab acuti-
tis febribus perire. Postremo magnam considera-
tionem, & pra alijs, Medici requirunt industri-
am, maximiq; momenti meritò censentur ob affe-
cte partis praestantiam, quae (vt inferius dicitur)
est ipsum cor, arx vitae; cuius parhemata periculo
vacare haud queunt.

I. de rat.
vict acut
t. 8. & 9.

Romani
Febribus
sacra fecerunt.

Qui scit
tractare
Febres ma-

gnam
partem
Medici
haec scit.

Legimus sanè Romanos olim Febri, tanquam
morborum formidabilissimo, sacra fecisse, ne ipsis
noceret.

Quicumq; igitur in hac tractatione febrium
diligenter, accurateq; versatus fuerit, is bonam
partem artis non abs re absoluisse existimabitur.

CAPVT I. Quid sit febris.

Febris

Lib: Caput I.

1.

Febbris vox à feruore profecta est (Græcis πυρετός ἀπὸ τῆς πυρός) quod ex ea corpus exuare, ac prope ignescere, soleat. Hipp. non solum vehementissimam, sed etiam mitiorem, πῦρ nominauit.

In Epid.

Definitur à Galeno varijs in locis variè. In lib 1 Aph. c. 16 Febbris, inquit, est calor natiuus conuersus in igneum, seu, conuersio natiue caliditatis in igneam 8 Meth. c. 1. Febris est, cum adeo immodicè auctus est calor, vt hominem offendar, & actiones ledat

Nos more Auicennæ, prima quati, tract. 1 c. 1. plenius hæc ratione febrem describere volumus: Febris est calor immodicus, in corde accensus, indeq; per venas, & arterias, in vniuersum corpus diffusus, actiones primò ledens.

Febbris quid.

Cum dicimus febrem esse calorem, qui actionibus primò, ac per se, sine alterius interuentu officit, ostendimus febrem esse morbum in intemperie, non in compositione, aut soluta vnitate. Cum calorē immodicū dicim, respiciamus ad calorē natiuū. Duplex enim reperitur in corporib9 nostris calor, natiu9 alter, seu naturalis, alter præter naturā. Illū innatum, & secundū naturam, & propriū, & primigeniū, vocitant: quod à primordijs nostræ generationis nobis inest, naturæ vernaculus, ac perquā familiaris. Idem quoq; est bene temperatus, seu

Calor in corpore duplex.

M m 2

à con-

Febris naturalis

De febr. in genere

à contrario refractus, & ad mediocritatem quandam, & moderationem reductus actu humidus: quoniam fundatur in subiecto, quod plurimum aeræ & aqueæ substantiæ continet; semine nimirum, & sanguine.

Calor innatus duplex. Calor hic innatus (de quo hactenus) vnus singulis nostri corporis partibus ab origine insertus, eo gradu, qui naturæ cuiusque particulæ expediat; quem ideo proprie innatum, implantatum, seu emphyton, & cum Auicenna, fixū dicere possumus. Estque tepidus quidam calor, veriùs potentiā talis, quā actū: eum proinde Gal aeri in cubiculo aliquo clauso, vel qualis æstatis tempore in domibus sentitur, comparat.

Influens calor. Alter qui ex corde, vegetior, multoque feruentior, cum sanguine, & spiritu, per arteriarū ductus, influit, priorem illū in partibus veluti sopitum, ac delitescentem, in actum deducit, fouet, confirmat. Quamobrem igni accenso domum calefacienti ab eodem Gal meritò assimilatur; cuius etiam subiectum, ac focus, ab Aristotele 3 de part anim, cap. 7. cor ipsum statuitur.

Influens hic calor ad omnes quidem operationes pernecessarius est; non tamen ab ipso proficiscitur actio, sed oportet hunc cum infuso in vnum conuenire, vt ex ambobus

Lib. Caput I.

2.

h⁹ coniunctis tertius quidam integretur, ac
requisit (Scholæ calorem hunc actuatum Astuat⁹
vocat) quo forma corporis, seu, anima calor ex
rationalis, tanquam idoneo vitæ ad functi- insito, &
ones instrumento, vtatur; in quem omnia influyente
illa caloris natui epitheta, atq; attributa, resultat.
quæ palsim apud Medicos obuia sunt, apud
finē dicuntur. Vt quod Gal & Hippo.
palsim calorem innatum, generationis no-
stræ, omniumq; naturalium operum, aucto-
rem, eundemq; subinde naturam, faculta-
tem corpus nostrum gubernantem, animā,
vel saltem animæ præcipuum instrumentū,
indigitant, de hoc calore pronuntiatum
fuisse debet existimari. Fernelius maiora, Fernelii
quàm par est, de dicto calore sibi persua- error cō-
dens, eum, veluti diuinum, cælestem, atq; futatus.
aluons, quàm hæc inferiora, originis, ad-
miratur, neq; eiuidem generis esse cum ca-
lore ignis arbitratur. Verùm hæc subablur-
da, viri docti aliàs, confutârunt. Hæc de
calore natuo.

Alter huic oppositus calor, præter natu- Calor
ram, externus, vel extraneus, & immodicus, præter
appellatur. Hic talis euadit, quando calor naturam.
natiuus, limites suos prætergressus, ad eum
visq; gradū exardescit; sub quo anima, tan-
quàm instrumento, suas operationes nequit

De febr. in genere

Calor
præter
naturam
eiusdem
est speciei
cum na-
turali.

inposterum edere. Hinc constat, illū non
alterius esse speciei (veluti quibusdam vi-
sum fuit) sed sola gradus intensione, acris-
monia, vel (vt loquuntur) secundum ma-
ius & minus, à naturali differre: siquidem
illud bene à Galenò fuit proditum, febre[m]
esse conuersionem naturæ caliditatis in igneam.
Nam vbi natiuus calor coulsq; progressus
est, adurit, colliquat, dissipat humores, &
substantiam corporis. Neq; tamen hac di-
scelsione ad naturam igneam calor natura-
lis ita definit esse, quin aliqua ex parte salu-
tem, licet imperfectiūs, vitæ, & naturæ,
munia obeat.

Calor
non na-
turalis.

Nulli autem dubium, inter hunc arden-
tem, seu igneum, penitusq; præternatura-
lem, & blandum illum, mitissimū, atq; na-
turæ muneribus præstandis accommodas-
tissimum, alium adhuc quendam medium
interuenire, qui naturali quidem maior, atq;
intensior, præternaturali autem remissior,
existat; quem propterea, in confinio vtriusq;
positum, non naturalem dicimus. Ita Gal. ad
scititium, & acrem, mordacem, & non na-
turalem calorem nominat, qui mutatione,
seu decursu ætatis, in corpus inducitur.
Cum enim siccitas sit lima caloris, erit vt
institus calor, ab adoleſcentia statim vsq; ad
vigo.

Siccitas

vigo
tend
ti rep
vbi
Quo
bied
nostr
sāgu
ctā, e
decre
tius
te pro
um, c
neres
Hipp
qua di
moritu
Cal
cet, a
febris
ximus
nihil
acutic
dient
Nam
Sanati
qua fe
ob cal

Lib: Caput I.

3.

vigoris tempus, semper magis ac magis in-
tendatur, itaq; plus terrei, & ignei elemen-
ti repræsentet, secus ac ab initio natiuitatis,
vbi aerea & aquea natura præualebat.

lima cal-
loris.

Quomocunq; tamen calor increseat, su-
biectum certè illius radicale humidum, ex
nostræ generationis primordiis semine ac
sanguine mœstruo, in solidis partib; dereli-

Caloris
subiectū
radicale
humidū.

ctū, cō magis perpetim imminuitur, ad cuius
decrementū, secundū proportionem, na-
tius calor etiam decrescit, quò longius æta-
te procedit: haud paulò aliter atq; clychni-
um, quamuis assiduo fruatur pabulo, in ci-
neres tandem vi flammæ redigitur. Vnde
Hippocrates non immeritò dixit, *hominem
qua die nascitur calidissimum humidissimum, quò
moritur, frigidissimum, siccissimumq; esse.*

Calorem hunc alterum, immodicum scilicet,
ac præternaturalem, genus in definitione
febris constituimus: quoniam (vt iam di-
ximus) febris est intemperies calida, quæ
nihil aliud dici potest, quàm intensio, seu
acuties caloris, supra modum naturæ expe-
dientem, cui rei fidem facit ipsa sanatio.
Nam Gal. 8. Meth. c. 1. alijsq; in locis, ait:
*Sanatio febris, est refrigeratio; & febris omnis,
qua febris est, refrigerari postulat, tametiā
ob causam illius, vel adiunctum alium asse-*
ctum

De febr. in genere

Num, interdum calorifica adhibeantur. Necessè est igitur, vt febris sit excelsus quidam caloris.

Huius deinde in calore excelsus, seu febris, focus, primumq; luscitabulum, in corde constituitur. Quoniam ratio periuadet in illa primum parte febrilem ardorem, qui corpus vniuersum accendit, exæstuat, atq; ebullire, quæ alijs omnibus per naturam etiam calidior, feruentiorq; est, adeoq; calorem vberem, tanquàm fons quidam perennis, in cætera membra diffundit. Adicimus calorē hunc à corde per *venas, & arterias*, in vniuersum corpus emanare. Tan, etsi enim à corde, supra mediocritatē naturæ vtilem, incalescente, per contactum quoq; partes; initio quidem proximæ; inde autem aliæ atq; aliæ successione quadam, in calefcere queant, tam subita tamen caloris diffusio per totum corpus, quàm subita in febribus apparet, non potest aliò, quàm in venas, & arterias, referri, tunc temporis feruidiori materiā imbutas, eumq; calorem quaquauerum importantes, nisi quid impediatur, vt frig. aeris ambientis, aut summus feruor visceris alicuius, sanguinem, & spiritus, cucurbitulæ ritu, ad le trahentis. Cùm enim acciderit, quod Hipp. 4. Aph. 48 prædi-

xit,

Lib. Caput I.

ale, ut interiores partes vrantur, externæ frigeant, cum præsentissimo vitæ periculo id erit; & Gal 1. Pror. tex Com. 7. febrilem ait non solum eum, qui in superficie corporis igneam habet caliditatem, sed & illam, idque multò magis, qui eam in corde, corporis penetralibus, ac visceribus, retinet. Per accidens igitur est febrili calori non expandi per totum corpus.

Ad hæc, verba in definitione posita, non tam actum, quam aptitudinem denotant.

Tandem etiam postremam definitionis particulam, febrilem æritum ab alijs magnis ardoribus hic verbis discriminauimus, quod hic debeat primo actiones ledere; alioquin calor febrilis ab alijs discerpatur. nim non omnis febris esset morbus, & multi calores, ut ij, qui ab exercitatione, meropotatione, balneo, cursu, lucta, &c. contrahuntur, ad hanc febrium classem perducerentur: quod tamen haudquaquam pertinent, nisi iam eouique increuerint, ut actionibus primo, ac per se, incommodent.

C A P V T II.

De febrium diuisione.

N n

Hips

5.

Cum partes interiores vrantur, exteriæ frigent.

De febr. in genere

Differen-
tie febr.
um.

Hippocrates 6. Epid. lect. 1. tex. 19. & Galenus 1. de diff. febr. c. 1. complures febrü divisiones assignat quarum eas, quæ minus evidentes sunt, atque exercitatum Medici actum exigunt, in præsentia prætermittimus.

Omniū communissima, vlti receptissima, & (veluti Galeno quoque visum est) propriissima, à subiecto, seu materia, desumitur, in qua primum febrilis calor conflatur. Cum autem ex definitione febris clarum sit, primam illius seu sedem, seu loci tabulum, esse cor ipsum, cor verò continetur ex tribus hisce, solida substantia, humore, & spiritu, consequens est asserere, febrem necessariò suscitari in cordis vel spiritu, vel humore, vel solida substantia. Primam es-

Tria pri-
marum
simplicium
colorum
genera.

phemeram, seu diariam, secundam visitato vocabulo humoralem, & tertiam hecticam dicunt. Necesse est autem tam in humoralis, quam hecticæ aliquod ex hisce tribus calefactum esse, reliqua duo solum calefieri: ut in humoralis primum calefactos esse humores, incallescere spiritus, & solidam substantiam in hecticæ contra solidam substantiam esse calefactam, incallescere spiritus, & humores. Plurimum porro inter se discrepant (Gal. teste) calefieri, & calefactum vlti, quando nimirum illud scilicet, id est, dispositio.

Lib. Caput II.

6.

dispositionem, hoc verò hexim, id est, habitum, denotat. Ad cuius rei pleniorē intelligentiam plurimūm conducit similitudo lebetis r. de diff. febr. c. j. allata Probatū igitur est ex iam dictis denominationem febribus ab eo peti, ex quo calor præternaturalis inchoat. Facilis tamen est transitus ab uno genere febris in aliud. Ita ab ephemera, ubi humores ita calefecerint, ut iam putrescant, naturā, & appellatione ephemera detinentibus, resultat humoralis. Pari ratione ex humoralis, & ephemera, si partibus solidis calorem altius impreterint, prouenit hectica. Constitutum igitur sit febries alias in spiritu, alias in humore, alias insuper in solidis partibus excitari.

Ephemera, quæ in spiritu consistunt, nullas habent differentias; nisi ex varietate causarum resultantes; de quibus in peculiari capite seorsim.

Ephemerae.

Humorales aliae sunt continuæ, aliae intermittentes. Continuarum quædam abloputredine infellant, ut synochus altera, de qua Gal 9 Meth. c. 2; quædam cum putredine, humore intra maiora vasa putrescente; qui si est sanguis, fit synochus pituita, cuius neminis Gal eodem lib. cap. 3; si bilis, fit caulos legitimus, seu tertiana; si purita, caua.

Humorales aliae continuæ, aliae intermittentes.

De febr. in genere ii

Febres **Symptomaticæ** **quæ.** **pestilens** **febris.** **Humores bisā-** **riam pu-** **erescunt.** **Humora-** **lium alia-** **diuisio.** **Sosporius**, seu quotidiana; si attrahantur, quartana. Hæ putridæ sunt, quas Gal. febres primarias, seu febres morbos, indigitat, ad distinctionem febrium, quæ initiamtorios viscerum affectus, phrenitidem, anginam, pulmoniam, pleuritidem, &c. comitantur; quæq; proinde symptomaticæ audiunt, & ad morem aliorum symptomatum, sublato, vnde pendent, morbo, ipsæ quoq; tolluntur.

De peste, ac pestilente febre, quam putridis annumerare solent, seorsim agendum existimamus; præsertim cū vulgata curandam febriū methodo ipsius sanatio non comprehendatur.

Intermittentium porrò, quæ fiunt ab humoribus, vel extra vasa, vel saltem extra maiora, putrescentibus, alia sit à bile, tertiana; alia à pituita, quotidiana; alia demum à succo sæculento, quartana. Quibus ex Hipp. 1. Epid. sect. 3. tex. 2. rectè annumeraueris quintanas, sextanas, septimanas, & huiusmodi longioris periodi febres. Rursus humoralium, harum febrium, aliquæ sunt exquisitæ, seu legitimæ, quædam contra ipsas. Exquisitæ appellantur, quæ ex humore illo, cui originem suam debent, solo, imo permixtoq; nascuntur: vt tertiana V. G. exquisi-

Lib. Caput II.

7.

exquisita illa est, quam vera bilis peperit. Sporæ, cum plures vno humore sibi inuicem permiscantur: vt, si in tertiana, bili accedit pituita, vel melancholia. Id ipsum de alijs quoq; febribus sentire licet.

Hætica tandem, quæ in solida cordis substantia firmatur, nequaquã in alias species inducitur, sed tantum certis quibusdam gradibus, vel morbi temporibus potius, distinguitur; cum alia sit inchoata, alia incretens, alia deniq; confirmata. Postremo febres omnes sunt, vel simplices, seuq; generis: vt ephemera, sola putrida, hætica sola: & ex putridis, vel sola continua, vel sola intermittens, &c. Vel inter se confusæ, atq; compositæ cernuntur: vt, hætica cum putrida, inter putridas continua cum intermittente, quemadmodum in hæmiticæ viuunt: vel intermittentes sibi inuicem copulantur, partim eiusdem speciei, hinc tertiana duplex, quartana duplex triplex, &c. partim diuersarum specierum, vnde tertiana cum quotidiana, aut hæc cum quartana non raro iungitur. Subinde afficiuntur aliquo: vt, inflammationi hepatis coniectuntur, dicunturq; typhodes, aut cum insigni, & ad se curam reuocante, symptomate, vt est febris syncopalis.

¶ N 3.

¶ Alia

De febr. in genere

Alia febrium diuifio coincidit cum ea, qua reliquos etiam morbos, & res quascunq; genitas, distribuimus penes tempora siue a-
tates suas, in principium, augmentum, sta-
tum, & (nisi lethalis fuerit febris) decli-
nationem; quæ decessio nominatur à Cor,
Celso. Hæc rursus tempora vel sunt vni-
uersalia, vel particularia. Vniuersalia di-
cuntur, quæ totius morbi ideam, & eam,
quam Hipp 1 Aph 12. Gal 1. de cris. c. 4.
castatafin, id est, constitutionem no-
minat, complectuntur. Sub hac acceptione
vniuersale principium durat (de humora-
libus agendo) quamdiu signa concoctionis
nondum apparent. Augmentum, cum in-
ualefcente calore, concoctionis quædam ve-
stigia conspiciuntur, si quidem morbus ad
salutem tendat, & cum symptomata inua-
lescunt. Status quando materia maxime
coquitur, febris cum suis accidentibus ve-
hementissima est, quæ aliquandiu neq; ma-
nifestè augeri, neq; diminui, deprehendi-
tur. Declinatio, cum & febrilis ardor remit-
tit, materia concocta est, symptomata mi-
niscunt, & æger leuius habet. Hæc vel om-
nia, vel aliqua tempora, quædam te-
bres celeriter, quædam tardiùs percurrunt,
& absolunt.

Vniuersa
de temp
quid.

Principiū
quid.
Augmen-
tum quid.

Status
quid.

Declina-
tio quid.

Parti.

Lib. Caput II.

8.

Particularia solùm in his febris locis Tempus habent, quæ per circuitus, seu, periodos, particula reuertuntur, quales sunt tam continuæ, re inquit. quam intermittentes omnes, præter typhos, locum habeat.

Periodum, seu circuitum, cum Galeno l. b. de morb. temp. c. 6 nominamus totum illud spatium, quod inter vnâ morbi accebtionē, & alteram, intercedit, ac in quotidianâ circumferibitur horis 24. in tertiana 48 in quartana 72

periodus
quid.

Periodus diuiditur in paroxysmum, & remissionem Paroxysmus, (eodem auctore l. Aph. Com 12) est deterior totius periodi tempus, principium, augmentum, & vigorem, seu statum, complectens Remissio declinationem morbi continet, & in intermittentibus apyrexiam, infebilitationem, integritatem Celso, seu tempus, quod a febre immune inter duos paroxysmos mediâ intercedit. alij interuallum, & quietem, dicere conlueuerunt.

Dimissio
circuitus
Paroxysmus
quid.

Remissio
quid.

Continuis febribus quinque assignantur tempora: Principium, æqualitas, augmentum, statum, & declinatio Intermittentibus hæc eadem, & præterea interuallum, seu infebilitatio

Tempora
febris
continuum,
intermittentium.

Tempora particularia deprehenduntur ex

De febr. in genere

Principi tur ex motu caloris, & progressionem sympto-
umquan matum Principium igitur adesse indica-
do adelt mus, cum calor ab extremis partibus retrahitur, ad thoracem conluit, atq; ipsa febrifica materies, ritu viridium lignorum, quæ flammam nondum edunt, accenditur.

Inz qua Inæqualitas, quum idem calor è ma-
litas quan teria, quæ penè obruebatur, emergere incipit, atq; eluctari, nondum tamen neq; intro, neq; foras manifestè inclinatur.

Augmen Augmentum quando iam manifestus
sum calor ad extremitates reuertitur, ac mor-
quando botam saburram, quanta præsentem paroxysmum concitauerat, superat, symptomata etiam omnia inualescunt, & exasperantur.

Status Status, vigorq; cognoscitur, quando
seu vi ad summam ebullitionem materia accensio
gor peruenit, calor vniuersum corpus ex æquo habet, omniaq; accidentia sunt vehemensissima.

Declina Declinatio, cum calor pedes occupa-
uo uit, deserto pectore, nocens materia distillatur, ac ventilatur; symptomata etiam mitigantur, seu decrescunt Hanc in intermittentibus quies, aut apyrexia, excipit.

C A P V T I I I.

De causa

Libr. Caput III.

De causis februm in genere.

Cum febrem dixerimus esse calorem immodicum, quæcunque eiusmodi calorem in nobis accendere, atque excitare nata sunt, ea februm causæ effectuales in uniuersum appellari merentur.

Horum quædam hic præstant cum motu, alia sine motu. Si cum motu, is erit vel corporis, vel animi. Corporis, ut equitatio, lucta, multum etiam, ac validum quodcunque tandem exercitium, lassitudo corporis, &c. Animi, cum spiritus, & sanguinis perturbationibus varijs variè agitantur, potissimum ira, timore, tristitia, &c.

Sine motu calefaciunt quædam per se, quædam ex accidenti tantum.

Eorumquæ per se illud efficiunt, alia actu, potestate alia calorem pariunt.

Actu rursus nonnulla intrinsecus, non nulla extrinsecus, inflammant. Intrinsecus, ubi V. G. putrilago aliqua latet in corpore, humoris, vermium, puris, ex abscessu, aut membri cuiuspiam ipso celo correpti. Inde enim putrescens vapor cordi adspiratur, & pro varietate materiarum, focique putredinis, hæc febres

Calor febrilis accenditur cum aut sine motu.

Sine motu per se, & per accidens.

Per se actu & potentia, A in extrinsecus & intrinsecus

De febr. in genere

febres exsurgunt. Extrinsecus, sol, ignis, calidius balneum, medicamenta, ceteraq; foris incidentia, quæ impensius calefacere queunt.

Potestate Potestate calefaciunt, quæ, vt effectum
quæ cale hunc edant, indigent calore nostro, quo
faciunt. manum porrigente, agere queant. Huius
ordinis sunt medicamenta, & alimenta sal-
sa, acrida, amara, &c.

Per acci- Ex accidenti calefacere creduntur,
dens ca- quæ per antiperistalticū calorem colligunt,
lesacien- & ad interiora compellunt. Adhæc, quæ
tia. prohibent transpirationem, eundem con-
duplicant, atq; accendunt, qualia sunt re-
frigeratio, cutis cōstipatio, partim à frigore,
partim alijs rebus adstringentibus, vt bala-
neo aquæ aluminosæ. Item leuior obstructio
pororum cutis. Nam his de causis natui
caloris ventulatio præpeditur, idemq; à fu-
mosis exhalationibus in corpore cōcreitis, &
intermissis, supramodum excrefcit, haud
aliter ac hypocausta, quæ nullos concepti
caloris habent exitus, magis ac magis astu-
are solent.

Ad febres Et quamuis hæc ita habeant, tamen,
excitan- vt ex his causis febris accendatur, necesse
das requi- insuper est eas, & esse vehementes, & ali-
sita. quando agere, corpusq; contingere; atq;
hoc

Lib. Caput IIII.

10.

hoc ipsum velut subiectū calori eiusmodi
suscipiendo apparatus esse.

Sed neq; hæc ipsa sola febrem accen- Aliare-
dere queunt, nisi accedat motus validus, & quilita-
vniō caloris natui in corde, & foco febris,
ab impetu quodam naturæ proficiscens,
quæ seipsa nullo magistro docta, magnis
corporis incommodis siue per concoctio-
nem, siue per expulsionem, non raro sub-
uenit, quemadmodum luculenter docuissi-
mus Thomas à Vega lib. de diff. febr. ma-
gnis argumentorum momentis euincit.

C A P V T I V.

De signis febrium commu-
nibus.

GAli. libello de marcore cap. 5. recte
docet, calorem immodicum, seu fe- Commu-
brilem, ex tribus, tactu nempe, respiratio- nia febris
ne, ac pulsu, certissimò cognosci. signa.

Tactus certè si non in vniuerso cor-
poris ambitu, in thorace tamen, & hypo-
chondrijs æstuantem illam caliditatem ma-
nifestè prodit.

Sic respiratio quoq; maior erit, frequen-
tior, & velocior, quàm secundum naturā
esse

De febr. in genere

esse deberet; nisi fortè affectus aliquis aliq. feбри coniunctus, illud impediāt, ut pleuritis V. G. phlegmone diaphragmatis.

Adhæc, spiritus ab ore efflatus feruentior multò percipietur.

Pulsus rēpirationi, quoad magnitudinem, celeritatem, frequentiam, proportionē quadam respondebit. Et licet hæc ita sint constituta; non tamen in quavis febre ita conuenire est necessarium. Satis enim est in quavis febre vel vnum, vel duo, vel omnia caloris exuperantiam detegere.

Febris
qui ma-
gis ob-
noxii.

Inter corpora in febres quālibet sunt procliuiora calida, quā frigida Gal. affectante 7. Meth. cap. 8. In putridas verò, quæ omnium sunt frequentissimæ, facilius incidunt ij, quibus cor, aut hepar, iusto calidius, & humidius est, quemadmodū constat ex cap. 38 & 47. artis medicæ.

Prognosis
febris.

Ad anni tempora quod attinet, Ver & Aestas febrium sunt feracissima; De sexumares scēminis; Ex ætatibus adolēscētes, & iuuenes, frequentius febriunt.

Febres

quandoq; rē breues, an longæ, salutares, an exitiosæ, salutares. Hipp. in 4. prælagiorum libello de crīsis. 4. Aph. multa. Nos singillatim in tractatione singularum specierum suo loco adnotabimus. Illud

Illud animaduersione perquam dignum est, febres quandoque adeo non obesse, ut morbis quibuldam percurandis egregiam præstent operam, velut apoplexia, 6. Aph 5. paralyti, stupori, conuulsioni, 5. Aph 70. catarrho; nam febre succedente coquitur, dolor hepatis, & colico ex statu 6. Aph. 40 & 44. Alijsq; huius generis à frigida vel intemperie, vel materia, vel ystercis pendentibus.

De peccata ob
crapu-
lam lo-
quetur
Aph: 10.

CAPUT V.

De curatione febrium in genere.

GAL. lib 10. Meth. cap 9. febrium omnium, qua febres sunt, propriis, vnicumq; remedium statuit refrigerationem, siue per se, siue per accidens, actu, vel potestate, agat, Hippocrates 1. Aph. 16. humectationem in febribus necessariam statuit.

Febria
curatione
est refri-
geratio
humecta-
tio.

Nos vtrumq; præsidiorum genus hoc facere arbitramur. Cum enim febris omnis in caloris quadam efferuescentia, seu intentione, consistat, calor autem is naturam minus recipiat, adeoq; corpora siccat, nemo sanè dubitabit, vtriq; excelsus, caloris nomen, ac siccitatis, contrarium frigidum hu-

midu

De febr. in genere

Quousq;

refrige-

randum,

& hume-

standum

midum opponendum esse auxilium.

Quousq; verò refrigerando, humectandoq; liceat progredi, ex magnitudine febris discere oportebit, quam rursus è naturali temperie, suis notis designatâ, metiemur.

Tanta enim est febris, quanta corporis ægrotantis de pristina temperatūra ad intemperiem hanc morbosam, siue febrilem, facta discessio est. Tandiu itaq; in usurpatione prædictorum præsidiorum persistendum erit, donec corpus pristinae naturæ, seu temperamento suo, fuerit restitutum.

Atq; se-

quendus

in curan-

do febr-

ilis.

Cum igitur ætæ ambiens de eorum sit numero, quæ minimè declinari, aut deitari, queunt, ubi is debito feruentior erit, quia tum subit rationem causæ febrim fouentis, refrigerandum est impensius: contra ubi frigidior est, quoniam remedij vices explet, de refrigerantium more, atq; efficacia, demendum significat. Quod autem reliquum victus humidus febricitantibus omnibus conferat, ex citato, 16. sect. 1. Aph. iam liquet.

Quando

cibandi

febrici-

antes,

Sed & illud ex j. Aph. ii notum est de tempore cibandi, in accessionibus februm, quæ per circuitus reuertuntur, nihil cibi, potulæ, permittendum ante perfectam paroxysmi declinationem; nisi fortè æger os

ventri-

vent

croci-

nè v-

mant

nifeb-

putri-

ria pe-

stra re-

tauon

balne-

brum

re exp

etiam

gi, a

collo a

solitus i

aus fari

res suo

de feb

mus.

De

Lib. Caput V.

18.

ventriculi bile suffusum habeat, quem pi-
crocholon nominant; tum enim opportu-
nè vel in ipso paroxysmi vigore (Gal. affir-
mante 10. Meth. cap. 4. reficitur.

Antiquitus aquæ dulcis balneo in om-
ni febris genere utebantur, præterquam in quale, &
putridis, in quibus non nisi concocta mate-
ria peccante id adhibebant. Verùm in no-
stra regione, propter mutatam fortè viuendi
rationem, & corporum plenitudinem, aquæ
balneum, etiam in declinatione harum fe-
brum, periculo recidivæ non omnino care-
re experientia sæpenumerò demonstravit.

Postremo loco inter externa præsidia
etiam periculis quædam, & amuleta febrifus
gi, à veteribus celebrantur: ut, succinum
collo alligatum, ex Plinio; Saphyrus, & Chry-
solitus in manibus gestatus; & si quæ sunt hu-
ius farinae alia, quorum fidem penes aucto-
res suos relinquendam censlemus. Hactenus
de febribus in genere, seu communi, egre-
mus.

Externæ
præsidia
febris.

De febribus in spe- cie.

CA.

De febre ephemerâ.

C A P V T VI.

De febre ephemerâ.

Febbris ephemerâ, siue diariâ, (sic dicta, quod diei spatium non excedat, 4. Aph. Com. ss. apud Gal.) est calor immodicus in spiritibus accensus

Eadem tamen febris tamen in plures quandoq; dies producat, vel propter errorem in curatione commissum, vel densitatem, & occlusionem meatuum cutis, vaporum istum calorem arctius, atq; diutius, cohibentem, siue aliâs ob causâ efficientiâ stabilitatem, nomen diariâ non amittit.

Causa.

A quibus
causis
proveni-
at eph-
mera.

Provenit autem ephemerâ omnis ferè a causis procataceticis, seu manifestis, dempta illa, quam inflammatio adenum, seu bubo, excitavit, quæq; ex obstructione porrorû cutis, aut vehementi aliquo conatu, & vñione spirituum, atq; caloris, ad expulsiõem nocentis alicuius materiæ, vñ diarrhæa, & similibus excretionibus, iniurgentis dependet.

Causæ

Causæ externæ potissimæ sunt: inso-

latio;

latio, p
tio, m
tristitia
dia, diu
quenti

H
ribus c
cur. ac
In vn
hæc fe
nus ta
di pot
sarum
die ap
cta; G
nibus

Pullu
gn;er
tatem

dax, s
cioris
in tot

M
rum fe

Lib. Caput vi.

13.

latio, perfrigeratio, defatigatio, cutis densa. externa
tio, magnus dolor, animi pathemata, ira, epheme-
tristitia, curæ, timor, &c. peruigilium, inc-
dia, diuturnior sitis tolerantia, ebrietas fre-
quentior, &c.

Signa.

HAs causas distinguere, & à se inuicem,
tacente etiam ægro, discriminare, plu-
ribus docet Galenus 8. Meth. c. ult. de rat.
cur. ad Glauc. c. 2. 2. etiam de cris. cap. ult.
In vniuersum loquendo, facilius curatur
hæc febris, quam cognoscitur. Nihilomi-
nus tamen eiusmodi ferè notis deprehen-
di potest. Aliqua commemoratarum cau-
sarum febri præcessit; vrina statim primo
die apparet naturalis simillima, & conco-
cta; Galenus tamen ait 2. de cris. c. ult. om-
nibus communiter esse rufiores.

Pulsus est celer, & frequens, non uquam ma-
gnus; exquisitè autè seruat naturalem æquali-
tatem, mollitiè, & ordinem 2. de cris. citato.

Calor occurrit tactui minimè mor-
dax, sed qualis ab exercitio, aut vini mera-
cionis potatione, comparatur, isq; æqualiter
in totum corpus, febre increlcète, expansus.

Non adiunt graua illa, & molesta alia-
rum febrium symptomata, ingens cepha-

Signa di-
ana.

Pulsus.

Calor.

Sympto-
mata ad-

P P

lalgia,

De febre ephemera.

iuncta. lalgia, inexplata sitis; inquietudo &c. nisi febris ob dolorem sit genita.

Desinit cum sudore, madore, vel halituoso quodam transpiratu, vnâq; accidentia, quæ prius aderant, vt leuis dolor capitis &c. tolluntur.

A iuuantibus, & lædentibus petatum ephemeræ signum proponit, si æger, balneum ingressus, non inhorrescat. Nam vbi secus accidit, putridam subesse significatur.

PROGNOSIS.

Quod spectat ad prognosticum, hæc febris ex se omni vacat periculo, facile tamen in alia febrium genera permutatur; quam permutationem minatur dolor capitis ultra 16 vel 20, horas protractus, præsertim vbi æstus febrilis post tertium diem constanter durat.

CURATIO.

Curatio in eo consistit, vt causæ effectricæ, etiamsi non adsint, in contrarium permittentur. Ita vt opponamus vigilantiæ, lassitudini quietem, obstructioni apertionem, tristitiæ letitiâ, curis animi relaxationem.

Post opera dâda, vt immodicus calor spirituum restringatur.

Quibus intentionibus omnibus ferè ephemeris communia sint hæc præsidia:

balnea

Liber Caput vi.

14.

balneum, unctio, frictio, cibis euehymus, & facilis
concoctu, minimeq; obstruens: vinum album,
tenue, aquosum; si tamē certo adhibito disci-
mine, vt dicemus, vsurpetur.

Cura fe-
bris oria
ex insola
tione.

Ephemera igitur ex insolatione expe-
dit lauacrum aquae dulcis, & irrigatio, seu em-
brocha, sincipitis, ex calida, oleo rosaceo, om-
phacino salis experte, oleo violaceo, facta.

Si ex perfrigeratione oriatur, conue-
nit laconicum, seu aer balnei, & balneum ip-
sum aliquantū calidius: embrocha item ex oleis
temperate calefacientibus, vt est chamomelinum
irinum, kiliaceum. &c. Vbi autem huius fe-
bri catarrhus, aut grauedo iungitur, & ab ir-
rigationibus, & à lauacro abstinendum e-
rit, dum morbus declinabit.

Experfi-
geratio-
ne.

Cui desitas cutis occasione praebuit, ritē
curabitur, si eger diutius in vaporario maneat,
inde descēdat in labrū, & cōfricari se curet o-
leis rarefacientibus, chamamelino, anethino, &c.

Ex densi-
tate eu-
tis.

Cum fatigatio seu lassitudo peperit
diariam, balneum, mollior frictio cum oleo dul-
ci, ac multo, frequens item corporis refectio ali-
menti boni succi obita, ita tamen, vt euiletur
cruditas, ex usu sunt.

Ex fatiga
tione.

Ex perui-
gilio, & immoderatis animi
pathematis pendēti, prodest balneum, & dicta
iam designata; quae ad humiditatem insuper in-
clinēt;

Ex perui-
gilio, &
animi pa-

De febre ephemera

elinet; & nisi capitis dolor, venarumq; in temporibus pulsatio id prohibeat vini quoq; potus, præsertim ijs, qui plurimas noctes insomnes transigere, quibus speciatim quoq; applicari debent *somnifera remedia*. Hinc

Ex ira vi-
num o-
best,

excipe, quos ira etiam perseverans in febrem coniecit. Nam cuiusmodi hominibus vinum obest, priusquam animi perturbatio conquieuit.

Ex inedia.

Ma quam inedia peperit, humectate alimonia mox oblata tollitur; præsertim si corpora biliosiora sunt, & sicciora, ut est cremor pisane, lactuca, portulaca, pisces saxatiles, molli carne præditi, iuscula pullorum, &c. Huc facit & balneum, in quo diutius desidetur, & frictio cum oleo largo molli manu facta.

Ex siti.

Ex siti temperatum dulcis aquæ balneum, ac vinum bene lymphatum.

Ex crapula.

Ex crapula vomitus, ubi ventriculus etiam cibo nunc turget, alioquin clyster iniectus, aut glans subdita, nisi alius spote fluat. Ad hæc, lauacrum aquæ, somnus, & quies, beneficiunt.

Ex bubone.

Ex bubone, declinante paroxysmo, iuvant, balneum, victus tenuis, & vini abstinencia, dum inflammatio desierit.

Ex obstructione.

Ad eam postremo, quam obstructio patit, ephemeram soluendam, remedia, quæ in syncho-

syno

De

F

hum

quar

chos

seu c

acce

tuò

porro

mass

doqu

hac,

putri

si fini

incor

men

medi

C

synocho non putrida proponetur, cōducit.

C A P U T VII.

De febribus sanguineis, vel
Synochis.

Febribus diariis, seu, quæ ab inflammatis
spiritibus pendent, absolutis, succedit
humoralium appellatarum tractatio. De
quarum numero primo loco se offert Syno-
chos, (cuius Gal. meminit, Meth. cap. 2.) Syno-
chus cur
dicta.
seu continens sic dicta, quod vnam habeat
accessionem ab initio ad finem vsq; perpe-
tuò manentem, eamq; in plures dies ex-
porrectam.

Hæc febris dicitur calor immodicus in Syno-
massa sanguinis conceptus, qui calor quan-
doque cum putredine, aliquando absque
hac, infestat. choquid.

Vnde duplex confurgit Synochos, vna Synochus
duplex.
putrida, imputris altera. Quamvis hæc tamen
si finitima est ephemeris, earumq; generi non
incommodè accenseri potest, videtur tas-
men inter merè ephemeris, & putridas,
mediam quandam sortiri naturam.

Causa.

Causa Synochon proxima est vapor, vel Causa
fumus plurimus à feruidis in corpore proxima
P p ; succis

De febribus sanguineis

Synochi. succis sublatus ; qui postmodum non satis foras expirat, sed cohibitus, atq; in venas, & arterias quodammodo reflexus, ardorem quendam præternaturalem sanguini impertitur.

**Causa
antece-
dens in-
terna.**

Causa antecedens (Gal. auctore loco citato) est constipatio insensibilium cutis meatuum, seu pororum, vel carnium etiam subiectarum.

**Causa
externa.**

Hæc constipatio quandoq; dependet à causa externa, vt frigore ambiente, natatione in aquis aluminosis, limosis, argilosis, aut vitriolo imbutis, vel à sole feruente, aliisq; cutim impensius siccare valentibus.

Interna

causa alia

Quandoq; etiam interna causa huic præbet occasionem, si pori videlicet à succis, aut multis, aut crassis, aut lentis obstruantur.

**Locus
putrescē-
tis san-
guinis sy-
nocho.**

Omnes hæc in vniuersum causæ, vbi leuiiores fuerint, synochum imputrem, ingrauescentes verò putridam, proferunt. In quacumque putredine sanguis non totus corruptescit, vel contaminatur, sed ille potissimum, qui in vasis maioribus, inter alas, & inguina excurrentibus, continetur.

**Tres dif-
ferentiæ
synochi.**

Iam Synochon differentiarum (quemadmodum videre est apud Gal. 9. Meth. c. 3.) tres omnino computantur. Nam quædam carum.

earu
ad
Gra
noro
que
uale
tim
παρα
tur.
eod.
det
impu
subin
febril
tum
ἐπικ

gens
te ma
cuius
vrinæ
tentis
gius,
tes, ve
I

crior;
id est
hypost

earundem seruant magnitudinem ab initio ad declinationē vsq, quas ob id ὁμοτoves Græci nominant, quasi semper eundem tenorem retinentes, quædam ad statum vsque iugiter crescunt ἐπακμασικοι, id est, inualescentes, nominatæ; aliæ deniq, paulatim semper minuuntur, decrescuntq, idcō παρακμασικοι, id est, decrescientes vocantur. Huius tantæ varietatis causa (veluti ab eod. Gal. loco citato clarè decet) dependet ex quantitate vaporis, siue putridi, siue imputris, qui à calore febrili excitatur, & subinde resoluitur. Nam si post prolatam febrim tantū vaporis istius dissipatur, quantum attollitur, fit ὁμοτoves si minus, ἐπακμασικος, si plus παρακμασικος.

Signa Synochi imputris sunt: calor ingens, utpote ex plurimo vapore occursante manui, qualitate tamen non mordax, sed cuiusmodi est corporis à balneo exeuntis; urina crassitudine, consistentiâ, colore, contentis, à naturali habitu non discedunt longius, pulsus æquales, celeres, maximi, frequentes, vehementes.

Signa imputris synochi.

Putridam produnt: calor tangenti acrior, urina putredinis indicia præferens, id est, ad colorem roseum accedens, absq, hypostasi laudabili. Tralianus turbidam, & rubram

Signa putridæ synochi.

De febris sanguineis

& rubram eam indigitat : inæqualitas in pulsu putridis febribus propria, respiratio difficilior. His addunt nonnulli exacerbationem de tertio in tertium; verum hoc signum est potius alterius febris coniunctæ, aut synochi degenerantis à sua natura.

Communia utriusque signa.

Communia utrisque indicia tam impuridis, quam putridis synochis, corporis vniuersi inprimis oculorum, & faciei, vehemens rubor, ac lassitudo, præcesserunt, quæ plithoram accumulare potuerunt, & adtunt, quæ eandem præsentem testantur. Nam in frigida ætate, & corporis habitu frigido, vel gracili, vel raro, vel pauci sanguinis, synochos excitari minimè contingit, exquisitas videlicet. Quoniam febres variolarum, & morbillorum eruptionem comitantes, non desunt, qui ad synochos referendas censeant. Adhæc omnia

Morbilli & variolæ omnibus contingunt.

bus quasi hominibus accidunt. clarum igitur est non peræquè eas in omnibus esse synochos exquisitas, sed tantummodò in corporibus carnosissimis, quadratis, & sanguineis.

Prognosis.

Prognosis.

Synochi de genere acutorum morborum habentur, & quarto, nisi quid peccetur, vel circiter septimum diem, terminantur.

Ex

Lib. Caput vii.

17.

Ex imputri quæ multò securior est, in putridam facilis est conuersio; & rursus in vtroq; genere minus periculi adfert, quæ perpetuò decrescit, quàm quæ vel increfcit, vel in eodem statu perseverat.

Curatio.

SCopi curationis synochi (iidem autem terè sunt vtriufq; nisi quòd putrida validioribus eget auxiliis) in eo consistunt, ut cutis, corpusq; adeò vniuersum reddatur transpirabile, quæ densata sunt relaxando, quæ obstructa reserando. Item ut feruor sanguinis obviatur, & præternaturalis calor deferueat.

Curatio
cōtinen-
tis febris.

His intentionibus commodissimè satisfiet duplici præsidiorum genere, sanguinis nempe missione, (nam corpus ponimus esse plethoricum, deinde causa synochi creberrima est obstructio à sanguinis exuberantia, atq; vt à constipatione pororum cutis nata sit synochus, tamen relaxantia medicamenta locum non habent, nisi progressa missione sanguinis, quia etiam omnia calcfaciunt, & febrim augent, §. Meth. c. 5) & aquæ frigide potu liberaliore.

A phleb:
auspican-
da cura
synochi.

Relaxan-
tia ante
phleb: nō
vsurpan-
da.

Sanguinem mitti volunt veteres vsq; Quous.
ad animi deliquium, quòd inde totum cor que lice-
pus in contrarium statum agatur celerrimè at iuxta

Q q

ex

Ex

De febribus sanguineis

veterin
fententi-
am nite-
tere san-
gu.

ex lipothymia scilicet refrigerata.

Mittendus igitur sanguis est, nisi pro-
hibeant vires, & aetas, aut natura alio sibi
vacuationis genere salutem querere vide-
atur; aut cibus in ventriculo etiamnum in-
sit crudus, qui proinde prius vel euomen-
dus, vel concoquendus est, aut alius sit con-
stipator, quam quidem glande subdita, vel
infecto enemate, antea subducere, atq; emol-
lire, addebet.

Medica-
menta
phar. na-
e. antica.

Id ipsum præstabit lenè aliquod me-
dicamentum, ac refrigerans, vt
Syrupi rosarum soluti vnc. iij. vel iiij. vel
Violati soluti vnc. ij. vel
Bolus cassia solus, vel permixta etiā vnc. f.
pulve tamarindorum.

Pauperioribus sufficiunt

Pauperi-
bus me-
dicamen-
tum
Præcipi-
t. hemor-
rhagia vel
sudore
largo os
mitatur
phleb.

Electuarij Diaprunis lenitivi drach. 10.

Si omittatur phlebotomia Gal. citatus 9.
Meth. cap. 4. caloris nativi suffocationem,
aut syncopen, impendere tradidit; nisi fortè
robore vitium spontanea hemorrhagia, vel
large emanantibus sudoribus à tanta per-
niciie seruetur æger. Quòdcirca primo
quoq; tempore venam incidere oportet; sic
enim natura, parte oneris leuata, ideoq; con-
firmata, validius reliquam morbi materiam
propellit. Vnde post phlebotomiam ne-
cessario

cessari-
etiam
sudor
syncop
cto p

stent
tur a
tutu
casu

nem
inter
um e
ribus
bent
accu
turi.

ram
(ex
dubi
tem p
diap
tame
quea
sangi
tusate

cessario sequi solet alui deiection, interdum etiam bilis vomitus, quas res postea excipit sudor, vel maior totius corporis. Quinetiā synochus putrida (eodem auctore) hoc pacto præuenitur.

De tempore nil vetat, modò vires consentiant, quodcumq; venam aperire. Cæditur autem opportunè *Hepatica*, nisi ubi metuitur apoplexia sanguinea, vel angina; quo casu *Communem*, seu *Mediam*, præferunt.

Tutius verò est sanguinis detractio- nem pati, ut inter utramq; horarū V. G. 8. intercedant, quàm semel ad animi deliquium eum profundere; nisi quis in artis operibus diu multumq; versatus, vires decumbentis exactè sibi perspectas habeat, easq; accuratori quadam ratione nouerit dime- tiri.

In pueris vicariam phlebotomiæ ope- ram præstant *cucurbitule scarificatæ*. Sunt qui (ex Gal. lib. 4. de san. tuen. cap. 10.) non dubitant phlebotomiæ ob metum, aut æta- tem prætermittæ pharmaca diuretica, aut diaphoretica, oportere substituere. Quæ tamen curandi ratio non iniuria suspecta queat esse. Nam purgantia non educunt sanguinem, qui solus in præsentia, & quan- titate potissimum peccat: & Gal. per sanita-

Quo tem-
pore, &
quæ vena
secanda
in syno-
cho.

Tutius
est pati-
sang:
quàm ad
lipothy-
niam mis-
tere.

Omissa
phleb:
vtrum
diureti-
cis, & dia-
phoreti-
cis secun-
dum ali-
quos sic
videtur.

De febribus sanguineis

tem nullo urgente periculo phlebotomiæ purgationem succedere patitur, minimè verò in morbo tam graui atq; præcipiti. *Verinas* verò cientes, quæ validiora sunt (nam leuia nil hic effatu dignum præstant) calida cum sint, febrem augent; eademq; (quod de sudorificis quoq; intelligendum fuerit) in tanta corporis plenitudine, & acumine morbi, minimè conueniunt. Quæ tamen in progressu morbi, exhausta iam nonnihil plethoria; & si putrida est synochus, materia quadamtenus concocta, atq; domita, vsurpare nihil prohibet.

Ob imbecillitatē
virium omissa
phlebotomia:
frigida largiori
haustu propina-
tur.
Quæ ardeant à
potu frigida.
In imputrida
ari quo

Galenus, si ob ægri pusillanimitatem prætermissa fuerit phlebotomia, frigidam largiori haustu eius loco indulget; confidentius verò ijs propinat, qui etiamnum sani frigidæ potationi assueuere.

Excipiuntur alioqui à tali poculo, quibz aliquod viscus frigidus, atq; imbecillis, utpote ventriculus, iecur, pulmo, vel tumore quopiam pæternaturam laborat, ut inflammatione, & demate, scirrhus, &c. vel si aliàs morbus ex multis lentis, & crasis, succis constat, aut cum putredine consistit, neq; signa concoctionis adhuc in vrinis ostendit. Vnde fit, ut synochus imputrida quouis tempore & dum febris admodum feruet, & aestuat; putrida autem non

Lib. Caput vii.

19.

non antequam coctionis alicuius in lotio-
notæ appareant, potus hic frigida sit per-
mittendus. Dixi coctionis alicuius; integrâ
enim semper præstolari non licet, quia pe-
riculum est quandoq; ne corpus interest
sub tanto æstu, emarcescat, & in hecticam
insanabilem præcipitetur.

Post haustam frigidam multis fragulis
æger continuò inuolui & operiri debet, ut
dein, quot viuere solet, vomitus, vel su-
dor copiosus, vel alia deiection, succedat.

Quantum porro frigida propinari li-
cet, docet Hipp. in Epid. qui duarum he-
minarum, seu cotilarum, id est, vnc. xviii.
eam permittit; Gal. ad iaturitatem vsq; se
ingurgitare finit.

Si quid antè dictorum aquæ poculum
inhibeat, ad alia transire possumus, quæ mi-
nore periculo ardorem restringere valent:
Ut sunt, *Aqua hordei saccharati.* vel
*Aqua stillatitia endiuia, cichorei, acetosæ, fraga-
rum.* Et syrupus de limonibus, de endiuia, de ace-
tosâ, vel iulebis, rosaceo, violaceo, permittæ.

Vbi crassus, & viscosus, fuerit san-
guis, à veteribus commendatissimum est
xymel. Nobis Syrupus acetosus simplex, & oxys-
sacchara, in vfu sunt.

Si pororum cutis consilipatio febrim

Qq 3

peperit,

uis tem-
pore fri-
gida dâ-
da

In putri-
da appa-
rentibus
coctionis
signisfri-
gida pro-
pinanda.

Hautta
frigida
quid æ-
gro faci-
endum.

Quantum
frigida
propinan-
dum.

Si frigida
improbe-
tur quali
sint. d
lubenda.

A crasso
sanguine
temge-
nnae po-
tus

A con-

De febribus sanguineis.

Ripatione peperit, illam, præmissa humoris morboſi
cutis se- vacuatione, rarefacere, atq; relaxare oportet
bis ortæ frictione molli cum linteis calentibus,
curatio. ieiuno ventre, obita inunctione cum oleo cham
mamelino, anethino, &c. sudorificis mitioribus,
de quibus aliàs.

Victus ra- Victus ratio vniuersa ad frigidum dea
tio qua- clinet cum modica siccitate. Vitent carnes,
lis esse de vinum, oua, dulcia omnia; nisi varium im
beat. becillitas aliud inuaserit.

Quan- In imputrida Synocho parcissimè ci
tum in bandi sunt ægri, paulò liberalius in putri
impu ri da. Quapropter conuenièter datur *pi-*
& putri- *jana hordeacea, aceto rosacco, vel succo quopiam*
ci cibant- *acido, citri, limonum, aurantiurum, &c. condita.*
di ægri *Panis è frigida lotus, atq; similiter apparatus.*

Lactuca prius elixa, & vt mos fert, cum aceto
(rosaceum melius est) & oleo tantillo concinnat.

Ius pulli alteratum incocta oxalide, similibus
que refrigerantibus.

Quo tem Hora ieiunandi cibi est, cum æger le
pore ci- uius habet; aut vbi hoc tempus expectare
bis in- non possumus, quæ per sanitatem fuerant
mendus. consueta.

Potus in Potus in imputri esto, aqua fotana cru
imputri da, vel leuiter cocta, aut hordeata.

qualis. In putrida vero expedit præbere po
In patri *scam,*

scam, adiecto pauillo sacchari; aliis plas qualis-
cet oxymel, aut decoctum lentium.

In declinatione morbi, & virium des-
bilitate, vinum quoq; tenue, ac dilutum,
permitti queat.

C A P V T VIII.

De febribus biliosis; ac pri-
mum de Causo, seu ar-
dente.

Per febres biliosas, tam continuam, Febri-
quam intermittentem tertianam, & causi ge-
causam, seu ardentem appellatam, intelli- neralis ag-
gimus. De causo primo loco agemus, pro- cepue
pter cognationem, & similitudinem, quam
cum synochis obtinet, & quoniam eius cu-
ratio postmodum etiam aliis biliosis febr-
bus accommodari potest.

Hoc nomen *Causos* æquiuocum, & Nomen
pluribus febribus, diuersæ etiam naturæ, & causos æ-
ptatur: nam, latè loquendo, tribuitur om- quos
nibus, quæ magnum ardorem, atq; incen- cum.
dium, asserre conlueuerunt, vt synochis, &
tertiæ, tum intermittentibus exquisitis,
tum continuis: propriè verò, ac pressius,
significat febrem acutissimam, & quæ ex-

cerat

De febribus biliosis.

Causa ferre possumus, quod sit calor immodicus, ex humore bilioso, in cavis, prope cor, inflammato, ac putrescente, genitus.

Filiosi Biliosi humores appellatione complexi
humoris sumur & flavam bilem puram, & pituitam
appel- salia, quæ ipsa quoque, si non in forma substantiæ
latio, ali, in qualitatibus salte representat bilem.

Ad hæc sanguinem tenuissimum, ac seruidissimum, qualem apud Gal 2 de arte curat. ad Glauco. cap. 1. etiam erysipelatam quandoque progignit.

In quibus Omnis hic biliosus humor, sub quacumque
venit acceptione audatur, potest vel in venis cordi vicinioribus tantum, vel simul per putrescat omnia vasa, quæ sunt inter alas, & inguina, bilis, putrescere.

Venas prope cor dicimus, quæ pulmonem intertexunt, & hepar, caavam potissimum eiusdem partem, ventriculo incumbentem, ventriculum ipsum, maximeque eius orificium, vel loca ventriculo proxima, & ieiunum intestinum.

Causa duplex. Causos alius legitimus est, alius putus. Legitimus censetur qui ex fluxa bile, ac tenui sanguine illegitimus, qui ex pituita salia cum bile per mixture trahit originem.

Quibus annumeratur etiam causos aliter,

Lib. Caput viii.

21.

ter, cum sanguis biliosus extra venas extenditur, aut attrahitur ad parenchymata, vel carnes hepatis, pulmonis, ventriculi, vbi proinde erysipelas, vel phlegmone erysipelatoses, iuicitatur. Modum, quo causos generatur, docuit Hipp. 4. acut. sub initium.

Causa.

Causæ febris ardentis antecedentes sunt eadem cum aliarum biliosarum februm causis, omnia nimirum, quæ magnum bilis prouentum in corpore faciunt, eandemq; incendunt, & putrefaciunt: in primis iter longum, & quæuis alia exercitatio valida; cælo præsertim æstuoso, ac flagrante, veluti sub canicula: abstinentia etiam, vel nimia cibi potusq; parsimonia; aut eorundem calidiorum vsus: vigilæ, curæ, mœiores, ira, &c.

Causæ
antecedentes
febris ar-
dentis.

Signa.

Signa pathognomonica, id est, propria, Signa datq; perpetua, sunt intensissimus calor, proprius ingens, in legitimo magis, minus in causi. notho, conspicua

Minus propria, seu, quæ sine drophon. Signa minus propria, id est, assidentia, nominantur, computa-
Ri si solent, Præ-

De febribus biliosis.

ri solent, lingua sicca, aspera, nigra, amara quandoq; alias etiam salta: tormina, & cruciatus, ventris: in cauto bilioso aluus liquida, & pallida, deiecit; in altero à pituita salsa alui fluida simpliciter meminit Hipp. in Coacis prænotionibus. Vigilæ; mentis perturbatio, seu delirium, dyspnæa. Quæ signa prout in hanc vel illam partem magis impetu fertur morbi materia, etiam ipsa euariant.

Prognosis.

Prognosis.

CAUSOS, vt vehemens admodum, ita periculofus, & brevis, est morbus.

Raro quidem senibus, sed tamen maiori cum perniciæ, accidit.

Deploratæ sanitatis auguria sunt, per Aph. 43. sect. 4 si interiora vruntur, frigent extrema, & sius adest, nigricante interim lingua. Adhæc, mali ominis est, plurimum, ac vehementer, delirare; stillicidium item sanguinis ex naribus, & quæcumq; alia excretio pauca. 2. Prorrhet. tex. 47. & cætera apud Hipp. ex prognostico repetenda.

Quomodo

do febris

ardens

Finitur causos salubiter hæmorrhagiæ narium, & rigore superueniente. 4 Aph. 28 non tamen semper, nisi rigorem excipiat

incipiat alui duxus, & vomitus, vrinæ copia, sudores. Alioquin constat ex eodem Aph. lib. tex. 46. rigorem, febre non deficiente, & gro- iam debili, incidentem minari mor- tem.

Curatio.

Copi curationis sunt biliosum humorem a. tum emendare, tum euacuare: intem- periem calidam, siccamq; corpori vniuer- so, præsertim verò cordi, atq; hepati, inde contractam, extinguere: ac demum, si quæ sunt grauiora symptomata, quæ deesse nun- quam solent, eisdem lenimen adferre.

Scopi eu-
rationis.

Biliosus humor varijs modis vacua- tur, hæmorrhagia, vomitu, secelsu, vrinis, sudoribus.

Emendabitur frigorificis remedijs in- tus forisq; adhibitis, & corpore perspirabili reddito.

Hæc eadem calidam, à bile impressam, intemperiem, extinguere nata sunt.

Symptomata, quibus succurri maximè decet, sunt vniuersum imbecillitas, vigiliæ, sitis.

His intentionibus, quæ sequitur, cu- ratio satisfaciet. Et quoniam causam du- plicem supra constituimus, prius de legitimo sermonem instituemus.

Vnde eu-
ratio au-
spiciada.

Rr 2

In hoc

De febrili bilioſis

In hoc igitur, ſive à ſyncera bile, ſive à bilioſo pendeat ſanguine, dummodo vires, & ætas conſentiant, venam quamprimum aperiendam arbitramur, partim refrigeria ventilationis cauſa, partim reuulſionis. Nam alioquin metus, ne is copioſior ad loca cordi vicina, propter eorandem ardorem, attrahatur, & ibidem aduſtus, inflammatio nem pariat. Deinde, videmus naturam cuius rectè operantis imitatoreſ deſect eſſe Medicum, frequenter cauſam hæmorrhagiæ narium ſalubriter iudicare.

Medicus naturam cuius rectè operantis imitatoreſ deſect eſſe Medicum, frequenter cauſam hæmorrhagiæ narium ſalubriter iudicare.

Quæ vena ſecanda. Emitteretur verò commodè ex vena brachij dextra interna; niſi in pulmone, præſertim dextro, focus ſit febris; quo caſu antefertur ſiniſtri cubiti vena.

Quam ſanguis, ad eum ſerè modum, quem in ſynocha præſcripſimus. Parciùs in cauſa à ſua bile, & anni tempore æſtuato, aliſq; circumſtantibus, quæ cauſiores nos eſſe iubent in deſtrahendo ſanguine. De quibus vide Gal. lib. de rat. curan. per venæ ſect. cap. 13. & 14.

Si amarum fuerit os, bilis priùs vomitu (ve docetur 4. de rat. vict. acut. ſaſtio) eſt reiſcienda, & venter clyſmate eſt ſubducendus.

Vbi

Vbi turget materia, primo statim die pharmaco est opus, per Aph. ii. sect. 4. Me-
tuendum enim. ab ulteriori procastinatio-
ne, ne vires resoluantur, caliditas febrilis,
ad liquidum exerceat, aut humores putres-
centes in membro aliquo principe ita de-
fiantur, ut eius calorem innatum sua vel
mole, vel putredine, obruant, ac perdant
pietas.

Pharmacum porro ita comparatum pharmas-
ticum oportet, ut sine manifesta caliditate suo
perlungatur munere. Cuiusmodi habetur, pauperis-
simum.

Flor. Cassie,

Elect. Diacathol.

Elect. lenit. Florenzole, addendo
pro stimulo Elect. de succo ros. vel Diso-
prun. solut. drach. j. vel drach. j. l. id est forma bo-
leti; vel dissolvendo in decocto prunorum, sebæ-
sten; tamarindorum, in aqua endive, & viol.
parato.

Laetioris fortunæ hominibus exhibe-
ri potest Rhabarbari infusi drach. j. in eadem
aqua vel sero lactis, addendo syrupi ros. solut. un-
cias duas, vel tres; aut syrupi viol. solut. diligen-
ter parati.

Quod si materia non turgeat, nihilo-
minus tunc di medicamentis erit locus,
tenenda videlicet alui gratia; nisi prius se
fuerit

Turgens
te mate-
ria primo
statim
die medie-
candum,

pharmas-
ticum pro
pauperis-
simum.

Pharmas-
ticum pro
ditioria-
bus.

Non turs-
gente ma-
teria ve-

De febr. biliofis

summe fuerit lenis; quamuis minori paulò quantitate, & prætermisis ijs, quæ tumori cauiæ superioribus adiungenda docuimus. Potissimum verò id opus est factò, cum bilis multa in ventriculo, & vicinioribus locis, contenta, ex ardore, morfu, nausea, oris amaritudine, innotescit.

In principio morbi ante phlebotomiam adhibitam apparentibus, priusquam vena vulneretur, lenem eiusmodi purgationem adhibebimus. Alias ubi in principio morbi neglecta fuerit, plenior illa purgatio inperandum. Iterum nullum habebit locum, usque dum coctionis notas vrina demonstrabit, ac tum demum si nullam crisin ad excretionem natura attentauerit.

Per totius autem morbi decursum adhibebuntur, quæ biliosi humoris acrimoniam, ardorem, & corporis incendium resinguerent nata sunt, quorum copiam subministrabunt nobis ea, quæ infra in ratione victus dicentur. E quibus tamen non conueniunt, vel summè frigida, vel cum frigiditate simul adstringentia. Quoniam & putredini officium, & harum febrium crisin, quæ plerumque aut hæmorrhagiâ, aut sudoribus, terminantur, impediunt. Atque extrinsecus refrigerantia humores ad expulsionem ineptos

Ineptos efficiunt. Stiptica verò insuper vias præcludant non solum ad crisin, sed etiam ad febris remissionem, quæ ex humorum ebullientium perspirata contingit.

Quocirca bis die, more syruporum, propinabitur conuenienter

Aqua hordei delibrati, admixto syrupo violaceo, rosaceo, de nymphaea; vel detur

Syrupus acetosus simplex,

De limonibus,

De acetositate citri,

De acetosella,

Oxysacchara simplex; Cum aqua nenupharis, portulacæ, acetosæ, boraginis, enanthæ, fragorum, quadrupla, vel sextupla.

Quoniam in hac adeò flagrante, & æstuante febre, consultum est, dulcia ista, seu saccharata, copiosiore aqua diluere, vt sic minùs promptè bilescant, quàm communiter in alijs febribus solemus, cum ipsemet Hipp. mulsam hoc casu aquosam solum exhibeat.

Potiones verò eiusmodi dantur æstu frigida. Aëtius Tetrabibli 2. serm. j. cap. 28. quemadmodum etiam Arabes quidam, nihil dulce admittunt, sed pro syrupis offerunt manè haustum aquæ, in qua macerata fuerit vicia j. pulpæ tamarindorum. Verùm

Quæ laudantur, & quoties in die offerenda.

Dulcia diluenda copiosiore aqua.

De febribus biliosis

locum habere possunt ista in Syria, Africa, alijs meridionalibus, & ardentioribus terris partibus, nos temperatioribus incolimus patriam.

**Haustus
frigida
apparent
sunt
em
tionis
confert.**

Apparentibus iam coctionis indicijs vel perfectissime, vel item mediocriter, praclarum cauli legumini praesidium est haustus frigida largior, obiecta tamen conditionibus iam ante descriptis: cum, veluti innuimus, a tali periculo non solum vomitu, sed & alius, bilioses, lotium, lubinde cieatur.

**Balneum
rigida
condi
en cate
is pati
bus.**

Eodem etiam tempore usui esse queat aqua frigida balneum, quemadmodum Gal. indicauit 3. de rat. vict. acut. Com. vit. si aeger est iuuenis, bene carnosus, assuetus, aetate media, &c. quorum si quid desit, praestat solum temperatum: quanquam in nostra regione rarius praesidij, eiusmodi locus esse queat.

**si m. lo
hum tem
peratum
interio
ra medi
camenta
frig. cui
parti ap
plicanda
& quan
do.**

Et tertius praeter aliarum febrium morem, praetermissa tamen vacuatione, statim inter initia morbi, frigida thoraci, atque regioni cordis, veniunt applicanda, si quod caulos legitimus ferè hac cum synochæ commane habet) nullas evidentes faciet remissiones; alioquin minimè. Tum enim in vigore exacerbationis consultius adhibent.

berit. Enimvero non pectori solum, sed & hepati, & ventriculo vtiliter applicantur, si fontem mali illic latere suspicati fuerimus. Id ipsum quoque fiet & lumbis, & testibus.

Cardiacum epithema parabitur ex

Aque V. G. ros.

Boragina,

Nymphaea, an. vnc. iij.

Aceti rosati vnc. j. s.

Vini albi odoriferi, quale est Creticum, seu Maluaticum vnc. j.

Spec. diatrion sant.

Dismar. frig. an. drach. j.

Croci,

Camphora, an. drach. iij. Ex hoc pannum madentes, refracta nonnihil inter manus eorum frigiditate, pectori ea parte, qua cor est situm, applicantur.

In summo ardore, & squalore, lintea decocto hordei spissiore insuccata (quod pro ditioribus ex aqua violarum, aut lactuce, vel simili paratur, pro tenuioribus ex aqua fontis) toti thoraci magnam utilitatem induci queunt, cum subduplo, aut subtriplo olei violacei calentis. Vel unguentum infrigidans Galeni recens confectum. Admisto in preparatione succo plantae alicuius refrigerantis, lactuce, solani, &c. Quod ubi multum incaluit, mox immutatur. Vel denique mucilago seminum psyllij.

Cardia.
cum epi-
thema
quomo-
do para-
dum.

In sum-
mo ardo-
re quid
faciend-

De febris biliosis

Vinucent. Gal. in frigidans,
 Rosatum Mesues,
 Succus lactuce, yel.
 Semperuui, æquis partibus inter se
 contemperati.
 Hepaticum, epithema componetur ex
 Aquæ, vel succo, rosarum,
 Selani,
 Cucurbitæ,
 Semperuui, ana vnc. iij.
 Absinthij vnc. ij.
 Pulvere rosarum rub.
 Spodij ana drach. j.
 Trium santalor. an. drach. j.
 Aceti rosati vnc. ij.
 Camphoræ Gr. V. vel scrup. f.
 Huc etiam faciunt vng. santal. & rosatum
 ex aqua & aceto rosaceis prius abluta. Galenus
 commendat cataplasma ex farina hordei cum
 succo lactuce, polygani, plantaginis, &c. subactis.
 Lumbis conueniunt iam dicta in frigidans
 Galeni, adiecto tantillo camphoræ, identidem
 repetendum, ne scilicet nimium incalascat.
 Genitalibus ad mouere utile est aquam
 rosarum cum aceto, & pauxillo vini, confusam.
 Circa hæc porro topica in vniuersum
 diligenter attendendum, ne ventant in v-
 lum, cum sudoris erupturi signa, conspici-
 untur;

Galeni
 cataplas-
 ma.
 Quod
 lumbis
 conueni-
 ens.
 Genita-
 libus quid
 admo-
 uendum.
 Topicis
 uando
 q. itinen-
 ab um.

untur; maxime diebus criticis. Vide Gal 3.
de crit. cap. 3.

Ad symptomata, quæ magnam in hac Quæ præ
febre Medico negotium faciunt, præcipua hu
pue pertinet vitium imbecillitas; quæ tarius febris
moti congruente victus ratione, de qua sympto
mox, emendatur, & potest tamen alijs quoq; ma
modis haud parum fulciri. Huc igitur spe
ctant epithemata iam dicta, & odores gra
ti ex rebus refrigerantibus, aut temperatis,
excitati. Item quæ peculiariter restauran
tia dicuntur, conseruæ, condita, destilla
ta, decocta, pulueres, & aliæ formulæ pa
sim apud auctores expositæ. De conseruis
præferuntur alijs;

Conser.
uæ.

Rosarum.

Violarum.

Nymphaeæ.

Boraginis.

Iuube, quibus permisceri queant:

Species diama. frig. & parū aliquid

Confectionis Alkermes.

Ex decoctis istud inter alia efficacissi. Decocta
mum est:

Conseruæ ros.

Boraginis an. ꝑ. i.

Conseruæ viol.

De florib. nymph. an. ꝑ. i.

s 2

Sepe.

De febribus biliosis.

Spec. diamarg. frig. drachm. iij.

Fol. auri. num. 4.

Iusculi capi sufficienter elixi lib. s.

Aqu. rosar.

Violar.

Nymph. ana ꝑ. iij.

Dosis lī
quorū
dandi.

vitrea diligenter obturato ponantur, & in
B. M. leniter coquantur. Dosis excolatris
quotis sapiusculē cochlear. j. Inter pulve-
res primas meritō sibi vendicat, qui ex
margaritis in succo limonum, aut citri, dis-

solutis concinnatur: quem in aqua capō-
nis, aut boraginis, vel diluti vini cantillo,
aut conseruis cordialibus, aut iulepo quō-
piam iucundi saporis, præbere possumus.

Peruigi-
liū mor-
derans
tia, & so-
mnū
concilis
antia,

Peruigilium moderantur, & somnum
conciliant, unguentum rosatum Mesues, aqua
rosata ablutum, & cum duplo ungu. popul. ad in-
star cataplasmatīs linteō inductum: sicq; vt fro-
tem, & tempora, complectatur, adhibitur.

Præterea extremorū lotio bis die fa-
cta ex

Decotto flor. viol.

N. nupharis,

Anethi,

Cortic. radic. mandrag.

Folior. salicis,

Lactuce ana M. j.

Semi-

Lib. Caput viii.

27

Seminum hyoscyami albi vnc. f.

Capit. papau. albi cum seminibus

num. X. preparato.

Cum noctu cubare velit,

℞. Syrup. de papau. vnc. i. vel ij. cum aq.

Nymphae, violar. lact.

Eundo.
cubitum
quid sua
men
dum.

**Succum, cremorem, aut emulsionem ē semi-
num papaueris albi drach. 2. 3. 4. adduis paucis
aliquot amygdalis dulcibus excorticatis, cum aq.
simpl. calida, aut quod prestantius est, decocto
hordei, paratam; adiecto, si dulcibus ager dele-
scatur, subinde saccharo, aut iulepo violar. p.**

**Quibus tamen omnibus prestat diacoeon
Gal. ad vnc. f. drach. ij, aut, si vetustius est, vnc.
j. datum.**

**In pertinaci vigilia, quæ phrenitidis
metum incutiat, aliquid verè, ac propriè,
narcoticorum præbere tentandum est, vt
sunt:**

In perij.
naci
lia quid
fua en-
dum.

Requies Nicol.

Philonium Romanum,

Pilula de cynoglossa,

**Theriaca recens, etc. A quibus ta-
men, veluti antè monuimus, ex Gal. de
cris. temperandum erit, vbi signa imminen-
tis hemorrhagiæ cronicæ seic. proferent.
Sitim compescunt:**

Sitim ses
dant.

Lactuca, vel

ss. 2.

Poru.

De febr. biliosis

Portulaca retens in aceto prae-
cerata, & commansa, aut
Citria mala, vel
Limones, orbiculatim concisi, secus
charoq; respersi,
Pulpa tamarindorum ore retenta, item
Psyllij mucilago, ex aqua viol.
deprompta, & cum s. q. calidissimi sacchari
in mortario ad albedinem usq; agitati, cuius
mixturæ crebrò quippiam ore versandus
est.

Multum quoq; ad hanc rem faciunt
fontes aciduli, quibus locis commode ha-
beri possunt: quos hodie nonnulli dextere
imitantur aliquot guttis olei vitrioli, aut
sulphuris correcti, in frigidam coniectis, be-
neq; inter se mixtis, atq; agitatis.

Vsu insuper, & experientia, constat,
plurimum in hoc genere posse epithemata
omnis generis, paulò antè descripta, si quã-
titatem aceti in compositione auxeris. De
cæteris, quæ passim in Pragmaticorum li-
bris prostant, nihil in præsentia.

Dieta
qualis.

Dieta in vniuersum frigida & humida
esse debet. Quocirca cubet æger in loco
frigido, suavi auræ exposito, atq; si res pa-
titur, ad Septentrionem conuerso: corpus
tamen interea iniectis stragulis contega-
tur,

tur, fia-
se in v-
pauim-
ius loe-
acetum
et pari-
cubicu-
le, rosa-
lucis, se-
ed m-
quoru-
stae qu-
comm-
tuca, a-
terdine-
proinc-
pallori-
rosa, p-
rosacei-
nstitui-
aroma-
I
aqua
saccha-
fontan-
altera
oxyfa-

tur, fiat flabello ventulus, aqua gelida de vase in vas albiduo transfundatur, & eadem pavimento sapiulente conspergatur: cuius loco pro ditioribus aquam rosaceam, & acetum effundere licebit, huiusdemq; imbuta lintea in parietibus suspendere. Inferuntur etiam cubiculo utiliter plantae refrigerantes, violae, rose, flores nymphaeae, iunci, lactuca, portulaca, folia vitis, frondes salicis. Non admittantur multi homines simul ad decumbentem, quorum halitu aer incallescere potest. Praestat quoq; in lecto ampliori iacere, ut quis commodè huc illuc se transferre queat.

Cibus esto pisanahordeacea, cremor lactuca, cucurbita cocta. Apud nos ob consuetudinem paulò plenius cibare oportet; ac proinde permittimus in scula gallinaceorum pullorum in cocto hordeo, vel folijs lactucae, acetosa, portulacae, alteratorum, aut tantillo aceti rosacei, succi limonum, citri, &c. addito. Permittitur etiam gelatina, sine cinnamomo, & aromatizata, parata.

Pro potu utatur decocto hordei, aut aqua fontana cocta cum syrupo, iulepo, aut pectore saccharo violato, aut rosato; prodest etiam fontana, in qua maceratus fuerit panis ex altera aqua prius elotus; Vel quae sequitur oxysacchara:

℞. Aquae

De febribus biliosis

℞. Aquæ font. lib. iij. ſ.

Sacchari albi ꝑnc. ij. ſ. Coquan-

*tur ad consumptionē lib. vnus, adiungendo
in fine coctionis aceti acerrimi ꝑnc. iij. Mi-*
ſce.

In vigo-
re potus.

In vigore autem, ſeu ſtatu totius mor-
bi, nullus aquæ ſimplicis potus æquiparari
potest.

Alius, ni-
leuis ſit
clyſmate
ſubdu-
cenda.

Alius, niſi ſponte respondeat, alter-
nis diebus leni, ac refrigerante, clyſmate eſt
ſubducenda; cuiusmodi paratur ex jero la-
ſis, & decocto violariæ, maluæ, endiuie, cum
melle, & oleo, violaceis. Hactenus de cauſo
legitimo ſolo, ac per ſe, inſeſtante. Qui ca-
nim inflammatorios vicerum affectus co-
mitatur, non hic inter febres, ſed in parti-
cularium morborum curatione locum pro-
meretur.

C A P V T IX.

De cauſo notho, ſeu, febre ardente ſpuria.

Cauſo
ſpurio
quan- to
genera-
tur.

*C*auſos ſpurios, qui propterea, quoniam
in fine Hyemis & Autumni potuſſimum
aſſigit, hybernus etiam dicitur, loco quidē
generationis à legitimo dicto non diſcre-
pat, materia tamen diſcrepat, conſtat enim
ē picuiſſa

ē pituita falsa, vel sola, vel bilis admistione
adulterata.

Causa.

Causas igitur habeat mixtas necesse est,
quæ partim bilem, partim pituitam,
tum faciant auctiorem, tum putrefaciant, &
accēdant. Ut cū quis v. G. ætate, tem-
peramento calidus, in septentrionali regi-
onē, causo corripitur.

Accidentia, seu symptomata, quævis
in hoc, quā genuino, mitiora, ac veluti
dimidiata tantummodò sunt.

Causa
quæ.

Symptō-
mata
qualia.

Signa.

Signa huius mali apud Hipp. 4. de rat. vi-
dētus acūt. t. 13. sunt: aluus soluta, sitis
magna, nondum tamen prorsus implacata,
seu (et loquuntur Scholæ) extēsa magis,
quā intensā. Adhæc, lingua arida, aspera,
& falsa: Urinæ paucæ comparatione causi
legitimi, ac min⁹s procedentes, ob pitui-
tæ lentorem & crassiciem scilicet. Adest
insomnium, sed longè hic mitius, propter
vaporosam pituitæ naturam. Addit extre-
morum refrigerationem, quod de lethali

Signa
quæ.

T t

tamen,

De febribus biliosis.

tamen, ac maligno, causo accipiendum, ob uterum inflammationem, & natui calori, imbecillitatem.

Prognosis.

Prognosis.

Epid. 5, sect. 2. t. 85, mitior enim hunc facit rursus. priore soluitur & ipse huiusmodi hagiā natum, atque aliarum febrium in pituitosorum ritu, parotidibus, vel ab eis, per aures enato, iudicatur: cum etiam dolere coxendicis, aut cruris, & ipso crasi iuculo, quæ tamen omnia magis adiuncta, quæ iuente, alio accidunt.

Curatio.

Curatio.

In hoc casu venæ sectio non adeo necessaria per se est, nisi cum plethorica dispositione iungatur: sed nec potius frigida, neque alia actu, aut virtute, impensius refrigerantia ex usu sunt.

Trallianus lib. 12. cap. 3. temperatiori quadam, seu miti, ac tepido calore prædicta medicamenta commendat, cuiusmodi in externis epithemata, vel cataplasmata, ex seminibus lini, senugreci, farina hordei, fabarum, chamæmelo, meliloto, &c. queant parari.

Humor

Humor febrificus, obseruata semper coctione, & motu naturæ, temperationibus remedijs tractandus est, et sunt inter præparantia: *exymel, mel rosatum simplex.* De Præparatis purgantium classe, *agarnus, rhabarbarum, polypodium,* atq; his similia; quorum farraginem in curatione tertianæ ipuæ reperire licebit.

Victus ratio quemadmodum minus refrigerans, ita paulo plenior, permittitur.

Victus ratio.

CAPVT X.

De tertiana febre continua.

Tertiana continua fit ex bile putrescente in vasis minoribus, & a corde non nihil remotioribus: nunquam ad verā apyrexiam, seu, omnimodam intermissionem, perueniens, tametsi tertio quoq; die tantisperde vehementia, & ardore suo, remittat; adeoq; ægrum respirare quadamtenus sinat.

In tertiana continua, qualis putrescit humor, & in quibus vasis.

Causa.

Causas tam internas, quam externas eadem cum febre ardente sequitur, nisi quod hic sint leuiiores, & bilis minus sit inflammata, contineaturq; in vasis, velut antequam monuimus, a corde paulo magis distantibus.

Causa huius febris quæ.

De febr. biliosis

tibus. Vnde etiam euenit, vt alternis diebus, parte aliqua bilis putridæ per patulos cutis poros exhalante, febris remissior fiat: mox verò eadem bile, exustione sanguinis denuo accumulata, nouus insurgat paroxysmus, ac tertio quoq; die febris redintegretur.

Signa.

Signa febris tertianæ contis
suar.

Signa tertianæ cōtinuæ sunt: inuasio sine frigore, horrore, rigore; æstus totis magnus; affligit cephalalgia, adsunt, delirium, vigilie, linguæ ariditas, quæ flauo interim calore tincta est, interim etiam nigricat; vrgent sitis, & ventris constipatio; expiratio maior est inspiratione; pulsus celer, frequens, inæqualis; vrina rubra, vel flaua, tenuis consistentiæ, atq; ignea, quæ initio non nihil turbida videtur: in summa: omnia ferè, quæ in caulo dicta fuere, hic quoq; se produnt indicia; nisi quòd mitiora sint, & alternis diebus crescat febris, alternis decreseat.

Prognosis.

Prognosis,

Hæc febris semper cum periculo iuncta est, ob ipsam tum continuitatem, tum acumen; minus tamen ardente vocata lethalis habetur.

Para-

Paratiora in hunc morbum, velut etiam quousvis alios biliosos, (teste Gal. 8. Meth. c. 8.) sunt corpora, quæ temperamentum calidum siccum, vel iecur saltem calidius, obtinent, habitu gracili, ætate iuuenili, laboribus corporis, ardoribus, curis, vigilijs, &c. exposita, victui parco, calido & sicco, adueta, maximè ætate, & in calidis siccis cæli plagis habitantia, aere præsertim æstuoso: adhuc quibus euacuatio seu spontanea, seu artificiosa, aliàs consueta, fieri desist.

Quæ corpora sunt huic febri magis obnoxia.

Curatio.

Curatio tertianæ continuæ à causi the-
Crapeia nil discrepat, nisi quod lenius refrigerantia præsidia (de quibus etiam in sequenti capite, de tertiana intermittente, aliquid) & victum nonnihil plenior, exigit. Vbi verò crisis iam præfusa est, tum in hoc, tum alijs quoque morbis, ab omni medicatione abstinere decet, ipsiq; naturæ totum committi negotium.

Curatio discrepat

Vbi crisis adest, medicandum non est.

CAPUT XI.

De tertiana periodica seu intermittente.

T t 3

Terti.

De febr. biliosis

Intermittens ex quo generatur humore, et in quibus contineatur vas.
Tertiana intermittens dicitur febris, cui bilis occasionem præbuit, vel extra vasa, vt voluit Capivaccius lib. 6. Prax. cap. 29. & Trincavellus Com j de art. curat. ad Glau. cap. 7. vel intra vasa, minora tamen, quæ a minoribus ad maiora propellatur, vt Caidano lib. de causis, sig. ac locis morborum, prima parte, paragrapho 29. Hemitæus, &c. & Fernelio 2. de abditis rerum causis cap. 13. placuit, alicubi in corpore putrescens, ac tertio quoq; die affligens, ad interfectionem autem alternis perueniens.

Quætriplex hic febris intermit- tens.
Hæc in duplici solet esse differentia. Vel enim humor morbosus est solus, ac syncerus; & tum gignit tertianam exquisitam: vel miscellâ alicuius alterius succi deprauatus, & prodiit puria, aut notha tertiana communiter dicta. De priorum præsentia, de altera verò deinceps, agemus.

Causa.

Causas tam internas, quàm procatarcticas, tertiana agnoscit easdem, quas habet ardens, omnia videlicet, quæ maiorem bilis in corpore prouentum parare queunt; de quibus iam antea, neque enim materiâ, sed

sed solo putredinis foco hæc ab illa discerni
pat.

Ut porro tertiana exquisita agnatur, Quæ res
necesse est causas allegatas vel omnes, vel quarum
potissimas certè, temperamentum scilicet, ^{tur ve}
ætatem, victum, regionem, statum cœli, ^{hæc feb}
tempus anni, biliosa, seu calida siccata omnia ^{bris gene}
in vnum conspirare: alioquin pura, ac me- ^{retur.}
ra bilis, cui hæc febris originem suam de-
bet, laud generabitur.

Signa.

Signa in multis conveniunt cum notis ter-
tiana continuæ, propriè tamen hæc ^{Septem-}
præ alijs designant, & veluti digito mon- ^{præ alijs}
strant hæc, quæ sequuntur, septem: Modus ^{signa}
invasionis; qualitas caloris; pulsus; urina; ^{hanc az}
paroxysmi duratio, atq; terminatio; circui- ^{desse no-}
tus; similitudo morborum populariter gra- ^{tant, quæ}
vantium, ^{propria}
^{illi sunt.}

Nam, quantum attinet ad primum, Quomodo
inuat hæc febris statim inter initia cum do in a-
vehementi rigore; qui rei acutæ corpus dit hæc
vulnerantis, atq; pungentis, sensum præ- ^{febris.}
seferat.

Qualitas caloris æris ad tactum, vn- ^{Calor}
de febris ista caufodes, seu quæ caufon re ^{qualis}
præsen-

De febribus biliosis

Quomodo calor ardentis et inter mittens diffusetur. præsentat, à Gal. 2 de diff. febr. cap. 3. appellatur. Verùm ea inter vtrumq; est differentia, quòd quilibet in hac primo locum occurſu appareat: deinde paulò poſt ſub manu contrectantis remittat, & mitiſſis diffuſetur: in ardente autem ſemper ſibi ſimilis

Calor in vigore pertor- tum cor- pus ex- panditur perfeueret. Idẽ calor in vigore febris (quò tempore ſymptomata etiam omnia, ſitis, æſtus, &c. ingraueſcunt) æqualiter per totũ corpus expanditur, extremis artubus, non minus ipſo thorace, feruentibus.

Pulsus inchoante inuaſione debilis Pulsus inchoante inuaſione debilis eſt, paruus, tardus, rarus, minus tamen quàm quartanæ: quinimo tarditas à ſtatu naturali proximè diſtat. **Ordinatus item** ordinatus eſt, & æqualis, tam in vno, quàm pluribus iectibus: ſed in augmento protinus euadit magnus, vehemens, celer, frequens; omnis in æqualitatis, præterquàm febilis, expers. Eſt autem febilis in æqualitas, vt celeriore habeat ſyſtolen, quàm dyſtolem. Id quod putridas febres omnes, ceu character quidam, obſignat.

Vrina qualis. Urina, vt inquit Aëtius Tetrabib. ſerm. 5. cap. 19. choſterica eſt, leu ruſa, eademq; primis diebus nubeculam, vel enæorema laudabile oſtendit.

Paroxi- mus quan- tus. Paroxylmus 12, horas vix excedit. Auiſ- cennas

cenas (j. quarti tract. 2. c. 35) ait à tribus ad duodecim, quandoq; à quatuor ad quatuordecim, accessiorem extrahi; communiter autem 7. horis absolui; quæ de nostra solum tertiana, seu inexacta, inaudire par est. Quod si producatu paroxysmus viteius, tertiana simpliciter, & citra adiectionem, atq; quò quies breuior ipso paroxysmo fuerit (qui aliquando ad 18. 24. 36. horas ascendit) tantò magis extensa tertiana nominatur 2 de diff. febr. cap. 8. Peculiare insuper huic morbo est, finire paroxysmum sudore, vomitu, deiectione alui, biliosis.

Circuitus tertianus est, seu, febris tertio quoq; die reuertitur. Attamen huic signo, quod à numero dierum petitur, parum firmitatis inest: proinde bene Gal monet, j. de diff. cap. 10. Præstat febris ipsius modum, & formam, diligenter considerare, cum ex hac ipsa febres dignoscantur, haud aliter quàm homines ex figura, & propria forma, cognoscuntur.

Circuitus
tertianus
quasi
quod
todie.

Postremum signum à simili petitum, Signum nempe, si febres tertianæ id temporis passim in populum grassantur, non iniuria sua à simili petitum, spicari licebit, febrim, quæ tum à simili, tertianam potius fore, quàm alterius generis.

Prognosis.

V u

Tertiana

De febribus biliosis

**Prognos-
ticum.**

**Quot
periodis
finiatur.**

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Tertiana exquisita periculum haud mi-
natur, j. Epid. sect. 3. cap. 8 & j. de ait.
curat. ad Glauc. cap. 8. atq; eadem celesti-
ter finitur, quomā septena periodos, quod
longissimum est, non excedit. 4. Aph. 49.
potest enim, & vero etiam quandoq; inter
pauciores paroxysmi terminari, & quā
admodū Auceana j. quarti citato cap.
27. ait, ob materiæ subtilitatem, lucinde in
vincta accessione hanc febrem communi, ubi
vel vomitus, vel fluxus alui superuenerit.

**Quid pri-
modie ex
trina col-
ligitur.**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Quod si primo statim die vrina nebu-
lam albam, aut enæorema, monstrauerit,
significatur febrem ultra quantum circuitū
non prog. esuram; atq; adhuc citius densa-
turam, si pro nebula hypostasis laudabilis
primo die conspiciatur.

**Quantū
exquisitor
breuior.**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Quantū exquisitor est tertiana, tantū
breuior, & curati faciliior, erit. Vbi autem
in septimum vlcq; paroxysmum extrahetur,
tum statum, seu rigorem, idēq; symptoma-
tum omnium grauissimā exacerbatōnem,
in quarto habebit; quod idēcō monere
voluit, ne si vel aperta circa id tempus ve-
na, vel propinatum fuisse medicamentum,
vehementia illa accidentium tunc emer-
gentiū medicationi potius, iniuriā tamen,
quā morbo, imputetur.

Cura.

Curatio.

Scopi curationis eò spectare debent, quemadmodum in caulo monuimus, ut Scopicu-
 flauæ bilis feruor, atq; putredo, inhibeatur, rationis
 corporis ex ea concepta caliditas immodi- in quib9
 ca ad contrarium permutetur: quod par- consilur.
 ti in euacuantibus, partim alterantibus, affe-
 qui poterim9, atq; ijs etiam, quæ obstructi-
 ones expediant, sine euidenti excoalefactio-
 ne, ne videlicet febris inde sumat incre-
 mentum. Quoniam nisi corpus peruium,
 ac peripinabile, efficiatur, frustra in expu-
 gnanda putredine laborabimus.

Curatio
 cœrit, nisi sponte aliud officium fe- Curatio
 derit, incipiet, quietis tempore, ab euidem vnde, &
 lenitione, aut irritatione: sollicitabitur glā. quo tem-
 de iuuata, vel, quod præstat, molli clysmate pore aus-
 e sero lactis, hydreleo, & saccharo, vel modico picanda.
 mellis, aut ex decocto violarum, maluarum, hordei, mel-
 le rosato, oleo violato, cum tantillo salis concina-
 nato.

Instante iam paroxysmo, si quidem vo- Instante
 miturit æger, iuuandus potu aquæ simplicis paroxys-
 aut hordeaceæ, cui parum quid aceti fuerit ad sino quid
 mixturā, vel syrupus acetosus, vel oxymel simplex. faciendū.

Huc etiam digitus facit, vel penne oleo
 imbuta faucibus inserta.

De febribus biliosis

In paro- Alioquin quamdiu durat paroxysmus,
xylinoni- nil aggrediendum, & cum à somno, tum ci-
hil nol- bo, potuq; si fieri queat, ad vlc; inclinatione;
liendum. nem accessionis abstinendum; nisi æger fu-
erit pichrolus. Quo casu, & proximè ante
paroxysmum, & eius quocunq; tempore, ad
præcauendam vel lypothymiam, vel lyncop-
pen, aliquid cibi, potuq; offerre docet Gal-
10. Meth. cap 3.

Vrgente Vbi sitis clamosa vrget, expanso iam
siti quid in totum corpus calore febrili, præbere pos-
dandum. terimus iulebrosatum, aut conseruæ ros. vel vi-
olarum (nisi fortè profluuium ventris adsit)
dilutum aqua fontana laudabili, aut leuiter cocta,
in qua panis emaduerit, aliquandiu, aut hordeata.
Quinetiam eam colluere, vel ore versare, prode-
rit, quæ sitim tantisper fallunt, vt sunt: pruna,
passule, cerasa acida in aqua præmacerata, alias
quæ, quorum capite de causo facta est men-
tio.

Ad lenis- Ad leniendum verò rigorem, panni
endum calentes spinæ dorsi, hypochondrijs etiam
rigorem fomenta, commodum admovebuntur. Pro-
quid fas bantur quoq; delinente iam rigore, leues
ejedum. quedam extremorum frictions, quæ febrilis æ-
tius expeditius è corporis penetralibus for-
ras erumpat.

Declinãz Declinante paroxysmo, si nausea, &
vomeno

Lib. Caput xi.

35

vomendi desiderium, teneat, titillentur fau-
tes eo modo, quem in principio accessio-
nis proposuimus.

Sin ad ludores paratum sit corpus, iisdem
opera dabitur, pluribus stragulis, ac tegumen-
tis, intestis, & pota aqua hordeacea adhuc calida;
aut decoctio milij integri, adiecto postea subduple,
aut subtriplo, vini albi, quem Syrupum S. Ambro-
sij nominant. Hæc in paroxysmo.

Extra paroxysmum ita procedi debet.
Tempore in febricitationis, seu quietis, sta-
tim in principio, prima corporis regio leni-
ter expurganda venit; præsertim si nausea,
oris amaritudo, & alia huius generis, quæ
ventriculi, ac vicinarum partium, impuri-
tatem denotant, adfuerit. Id autem dextre
præstabunt:

Cassia fistula,

Tamarindorum pulpa,

Syrupus violatus solutivus,

Syrupus rosarum solutivus,

Elect. lenitivum,

Infusum rhabarbari ex aqua endiuiz, &

Syrupo de cichorio simplici, aut de

cichorio cum rhabarbato.

Manna item ex decocto tamarindorum,

flor. violarum, & endiuiz soluta;

quæ in robustioribus elect. de psyl-

Yu. 3

lia,

Medica-

menta

purgan-

tia.

te parox-
ysmo.
quid ag-
grediens
dum.

Extra pa-
roxy-
smum.
quomo-
do proce-
dendum.

De febr. biliosis

lio, aut elect. de succo rosarum
drach j. vel circiter, aut Gr. j. aut
altero diagridij, ex cui queunt.

An vena
secunda
in hac fe-
bri.

Si exqui-
sita sit
tertiana
sanguis
mittens
dus.

Vena fe-
bris mul-
tiplex re-
medium.

Quo te-
pore mor-
bi, & quæ
vena ape-
rienda.

Missionem sanguinis pleriq; in dubiū
vocant, eo quod vires cum hoc morbo mi-
nimè constare posse videantur. Nam febris
ista biliosis solum corporibus, macilentis;
cælo, anni tempore, ac regione, ætuoſis
accidit. Quibus sanè subscribimus, cæta-
men animaduersione adhibita, quod cum in
noſtra patria exquisitiſſimæ illæ tertianæ,
ob rationem victus, & aliis, quæ deſideran-
tur, conditiones, rarissimus sit affectus; si
tamen forte fortuna contingat aliquem hac
febre, licet impuriore quadam tenus, pre-
hendi, huic phlebotomiam non iniuriā
profuturam arbitramur, ratione saltem cau-
sæ antecedentis, ne scilicet sanguis tenuio-
ri parte sui per ardorem febrilem bileſcat;
præſertim cum venæ ſectio (quemadmo-
dum liquet ex vaſeſio lib 7. Contr. cap. 2)
multiplex sit remedium, & quotidiana testi-
tur experientia, sanguinis miſſionem, tem-
peſtiue factam, plurimum prodeſſe, ac mor-
bum, sæpè radicatus extirpare. Vbi ventricu-
lus igitur, & primæ viæ, a medicamento
sunt depuratæ, aut si quidē illuici in hiſce
partibus nulla extant indicia, sub noſtro
quidem

quidem celo statim per initia febris, tamen
extra paroxysmum, vel cum ægri vires ro-
boriores sunt, horis minimum 4. aut 5. pri-
usquam accelsio fiat, vena iccoraria dextra,
aut communis, aperietur.

Quibus autem istud, impediēte vel ata-
te, vel viribus, facere non permittitur, his Scarificatio.
vix esse potest scarificatio.

His ita peractis, si paroxysmus infe-
quens priore breuior, & quod ad sympto-
mata attinet, leuior sit, urinæ quoq; corri-
gantur, totum negotium soli naturæ com-
mitti queat. Tamen si non abs re, pro naturæ
adnuculo, remedia quædam usurpabim⁹,
quæ cum refrigeratione extenuent, & ob-
structiones eximant; qualia censentur:

Radices cichorij,

Plantaginis,

Acetose,

Endiuæ,

Agrimoniæ,

Graminis,

Semina Maiora, & minora; cum

Syrupo capillorum Veneris, de cichorio

simplici, acetoso simplici, &c.

Exhibentur autem apozemata cuiusmodi Tempus
die infebriationis ieiuno, quatuor nimirū exhibenda
horis ante prandium. Possunt etiam toti di apoze-
dem,

De febr. biliosis

matum, dem, vel pluribus, ante paroxysmum horis hæc eadem offerri.

Non mi- Quod si paroxysmus à phlebotomia
tescente nil mitescit, neq; natura vacationem ali-
à phleb: quam bilis adonitur, aut, si quam adonitur,
paroxys non perficit, dummodò vrina coctionis
imo quid notas (vt in hac febre asolet fieri) præse-
faciendum. ferat; pharmacum, quale initio præscriptu-
mus, vel paulò fortius, præscribendū erit;
interpositis nihilominus apozematis iam
nominatis, in nostræ præsertim regionis
hominibus, cum sub hoc cælo tertianæ pu-
ritatem illam non seruent, id. 3. ter, & am-
pliùs, vtiliter iterato, ne in præsens vtcunq;
suppressa potius accessione (quemadmo-
dum vulgi mos fert) quàm euulsia febre, re-
liquiæ morbificæ grauioribus malis funda-
menta iaciant.

Desinens Sed & desinente prorsus febre, super-
te febre stite tamen aliquo eius accidente, vt siti, do-
superstite lore capitis, inappetentia, omnino necessa-
manens ria est purgatio eiusmodi, ad præcauendam
te aliquo scilicet recidiuam, 2. Aph. 12.

quid fac Cùm ardor summus, & intensissimus
ciendum. est, velut in tertiana exquisita esse solet, tum
Calore in alterationi, seu refrigerationi, maior quàm
summo e. euacuationi, danda est opera. Vnde plera-
xistente, que in capite de causo annotata, remedia e-

tiam

Lib. Caput xi.

37

tiam hîc habebunt locum ; soletq; post co-
 ctionem, haustus frigida, modo illic expli-
 cato, concedi Quò respiciens Gal. j. de ar-
 te curat ad Glauco. cap. 9. in curatione hu-
 ius febris, nullius purgantis pharmaci me-
 minit, sed tantum *absinthij dilutum ex aqua*
nulla docuit exhibendum, monens interim,
 & sudores, & vrinas ciendas. Verum sudo-
 res rectius declinante accessione, vrinae
 autem intermissionis die, felicius prouo-
 cantur. Ad ciendas porro vrinas facere que-
 unt descripta superius apozemata, quae hu-
 ius proposito melius seruiunt, si adiciantur
radices p. trofelin, & fœniculi; quas praestat
 horis aliquot in aceto praemaceratas vsur-
 pare. Galenus his substituit apium, & an-
 ethum. vnde ad Trallianum lib. 12. cap. 6. eu-
 nimis calefacientia adhibens carpitur. Pro
 Galeno tamen non ineptè respondebitur,
 haec quamuis per se calida, cum humorem
 biliofum eliciunt, & obstructions referant,
 ex accidenti refrigerare. Deinde tum pri-
 mum ea dari, cum cognoscitur, naturam in
 has partes materiam destinasse; quocirca
 nequeunt dum in corpore morari, & per co-
 sequens, minus calefacere queunt.

Absinthium porro alijs medicamentis
 anteponitur, quoniam praeter id quod bi-
 leum ex-

alterans
 dum &
 refrigeran-
 dum po-
 tius quã
 purgan-
 dum.

Sudores
 quando
 prouocan-
 di & vri-
 nae.

Medica-
 menta v-
 rinas cie-
 tia quae.

Gal à re-
 prehensio-
 ne vindi-
 catur
 Quando
 medica-
 menta v-
 rinas
 cientia
 danda.

Absinthij
 um alijs

De febribus biliosis.

medica- lem expurgat, stomachum etiam, qui in
mentis bi- praesentia plurimum à bile laedi consuevit,
lem pur- roborat, in quo pl^{us} est utilitatis, quam in il-
gantibus lo qualiquali calore incommodi.
& urinae
mouenti- Symptomata hic ferè sunt eadè, quæ in
bus ante
ponitur. causo: de dolore capitis tantum, de quo quia
Sympto- nihil ibi, hic pauca adiciemus.
mata. Is ubi pulsatorius est, à missione sangui-
Dolor ca- nis coquiescit. Sin è ventriculi aspiratione na-
pitis san- tus, vomitu, aut deorsum purgante cholago-
guinis sedatur. Si è toto corpore vapores in cere-
missione brum feratur, ij sunt à capite auertendi frictioni-
conquies- bus platarum ex sale, & aceto, clysteribus lenibus,
scit. cur uribulis item, quæ scapulis, atq; claviculis,
Extrema imponuntur; lonionibus extremorum ex
lauanda. Aqua decocti lactuce,

violarie,

Florum nymphaeae,

Foliorum vitis,

Salicis,

Capitum papaueris albi Cui decoctio,
actu calenti immergenda sunt tibiae, &
Caput ro- brachia, vsq; ad cubitum.
borandum. Caput insuper roborandum, vt euapo-
rationes illas à sese arceat, quæ, declinante
Caput ro- nonnihil dolore, moderatè discutienda, at-
borantia. quæ resoluenda sunt. Roborat caput oxyr.
ex quinq; partibus olei rosati, & una acetum de-
natum. Vcl

q. Aqua

Libr. Caput xi.

38

℞. Aqu. rosarum,

Plantag.

Solani an. ꝑnc. iij.

Olei rosati,

aut aqua ros. abluti ꝑnc. j. s. Omphas

cini recentis, Aceti rosacei tantund.

Pulueris santal. rubr. drach. j. s. mise.

Vapores autem capiti impactos blan- Vaporib9
dè dissipant, & consumunt, lumbrici terre dissipant
riti, atq; cum oleo ros. subacti. Adhæc, aqu. ros. dis quæ
aut solari, & meliloti, addito sale, crocôq; e qui conue-
bas madêtes panni luturæ coronali, ac fron- niant.
ti, imponantur. Item emulsio nucleorum Per- Quid ca-
ficorum, cum aqu. rosar. & betonice facta, mo- piti appli-
mentoq; thuris leuigati adiecto. Vel oleum cha- candam
memelinum cum rosaceo illitum. Huc etiam & cui par-
spectant: syrup. de papauere vno j. s. cum ti.
aquæ lactuce ꝑnc. iij. duabus à cæna horis Aegro
dormituro propinatus, atq; epithemata car- dormitus
diaca, simul & hepatica refrigerantia, iam antè ro quid
descripta. propinan-
dum.

Nam quatenus viscerum istorum ar-
dorem temperant, eatenus quoq; acrium
fuliginum prouentum, adeôq; in cerebrum
ascensum, prohibent; & sic quasi per indirec-
tum hîc quoq; sunt vsui.

Aur debet esse similis illi, qualè in febre ar- Viatura-
dente descripsimus, hoc est, frigidus humidus. tio. Aur

X x 2

Pro

De febribus biliosis

quales cō-

ducat.

Fercula

quæ con-

ferant.

Olera quæ

præstant.

Oua.

Carnes

quales cō-

ueniant.

Gal. quæ

lia edulia

probat.

Piscibus

quib. ve-

scendum.

Alimonia

quomodo

preparata

& condita.

ia.

Pro ferculis inferre licet *pisane cremosæ*, seu *hordecum ad molliciem coctum*, *coloquintida* *transmissum*.

Olera item, *lactucam*, *portulacam*, *endiuam*, *acetosam*, *spinachiam*, *maluam*, *atriplicem*, *choreacea* in *uniuersum omnia*; quæ rectius cā *carnibus elixantur*, vt *iuri dein vires suas imprimant*.

Oua *adhæc tremula, aceto condita*.

De *carnibus* conueniunt *teniores*, *minimè pingues*; & in *autum* quidē genere *molliores*, vt *pulli gallinacei*, in *dumetis degentes*, *passerculi*, *perdices*, *phasiani*, &c. ex *ijs* verò, quæ *minimè tales sunt*, *alæ*.

Galenus concedit *cerebella porcellorum*, & *pedes molliter elixos*, non quidem *indulcrinatum omnibus*, sed *ijs tantummodò*, qui *præ nimia ventriculi caliditate*, *cibos coctu faciliores*, aliàs essent *corrupturi*.

Ex *piscibus* prædicantur *saxatiles, perca, lucius, trutta, mulus, barbatus*, &c. pro quibus *substituere poterimus minutulos illos*, quos *Germani fundulos* vocitant. Et verò hæc ipsa decet esse *elixata solùm*, non *tolta*, non *frita* in *butyro*, vel *oleo*, non *multo sale*, aut *aromatatis*, *conspersa*, vel *melle addito*, *edulcorata*, cū *acria omnia, salia, & dulcia, hic merito suspecta sint*.

Ex

Lib. Caput XII.

39

Ex arboreis fructibus præ cæteris conceduntur, vix bene maturæ, magis tamen pensiles, fructus, qui in vasa sum veniunt, item, prunæ, & pomæ coctæ. Verum illa reliquis edulij præmitti par est.

Die paroxysmi carnibus, & ouis, interdicitur; quamvis nunquam ventriculus multo cibo infarciendus, ac onerandus, sit; nec & oua etiam die quietis, vt habet Hipp. 2. Aph. 10. exulcent. & 7. Aphor. 52.

Pro potu, ante perfectam morbi declarationem, vinum & generosum, & valde etiam aquosum, nocere solet; proinde vel ex decocto hordei cum passulis, vbi maior est ardor; vel radicibus cichorei; aut cum passulis, & hordeo, cinnamomi tantillo bulliente, paratur poculum.

Alium expedit esse liberam, aut die, quo febris adest, leni clysmate elui; quod omni die infebrecitationis vtiliter iteratur, cum æger medicamenta per os sumere renuit.

Vigilijs pertinacioribus iam supra fecimus, medellam.

Animi affectus grauiore, iram præsertim, mœrorem, nimiamq; sollicitudinem, studiōe deuitare expedit. Hactenus de terrena intermittente legitima.

C A P U T X I I.

X x 3

De ter

De febr. biliosis
De tertiana intermittente
notha, seu, spuria.

Notha tertiana quibus humoribus conflatur. Febris maioris & minoris famæ quæ.
Tertiana notha, seu spuria, intermittens. Est febris, è miscella alternis alicuius humoris cum bile, prodiens. Humor is, qui bilem adulterat, est vel pituita; & nascitur maioris famæ spuria, eo quod nequentius accidat; vel melancholia, & minoris famæ, seu rarior ab Arabibus nominata, resultat. Nobis de priori agere sufficit cum Gal j. de art. curat ad Glauco. cap. 10. quoniam posterioris tum natura, tum curatio, partim è præcedenti capite, partim eo, quod quartanæ inscribetur, facilis est cognitu.

Causa.

Causæ huius febris procreatrices non iniunctæ ab omnibus reputantur vtriusque humoris feracis, bilis nempe, ac pituitæ: ut sunt V. G. corporis temperamentum, ætas, anni tempus, regio, status cœli, calida sicca; vita interim ociosa, frigido & humido, vel aliàs immodico, cibo; potuque, utens, unde cruditates, & pituitæ abundantia.

Quæ spu-

Cæterum pituitæ aliquando plus, aliquando

Lib. Caput xii.

40

quando minus, sub ampla quadam latitudine, cum bile putrescit: unde fit, vtharum tertianarum spurarum quadam propius ad exquisitæ naturam accedant, quædam longius, quædam verò quam longissimè recedant.

ria ad exquisitæ naturam propius accedat.

Longissimè recedentem, in qua pituitosus humor copiosissimus bili commiscetur, Gal. j de art. curat. ad Glauc. cap. 8. describit, tanquam exquisitæ valde contrariam; quoniam cognitis extremis, intermediæ haud difficulter innotescunt.

Quæ longissimè, & exquisitæ tanquam contraria.

Signa.

Signa tertianæ spuræ, non aliter ac materia, ipsam efficiens, confusa quoque sunt; & partim bilem, partim pituitam, denotant. Hinc rigor multò est, quam in exquisita, leuior; verùm protrahior, quandoque horror tantùm inuadit; calor ad tactum remissior, ilque non ita æqualiter per totum corpus expansus.

Signa tertianæ spuræ qualia

Pullus minor, tardior, rarior, & in intervallo etiam febrile quiddam retinens, aut saltem non tam purus ac in exquisita.

Pullus qualis.

Urina citrina, sed crassior.

Urina qualis.

Accessio à 14. horis ad 30. & 40. se extendens.

Accessio

De febribus biliosis

Quanta. tendens, quæ neq; cum vomitu, deiectione, largiùs sudoribus, sed madore cutis potius, vel paucò interdum sudore, finitur.

Circuitus tertianus. Circuitum quidem & ipsa tertianum retinet; quandoq; tamen, ad tertiana duplicis ritum, quotidie inuadit.

Causæ antegressæ. Ad signa referri merentur causæ antegressæ, à quibus bilis, & phlegma, acervari potuerit, diætæ nempe, & alia; de quibus superius.

Nota in hac febre circa finem. Item, si tales febres vagantur populariter. Circa hæc porro signa in vniuersum animaduertere decet, ea aliquando exquiritæ tertianæ magis esse affinia; aliquando crudi succi plus repræsentare.

Prognosticon.

Prognosis. **H**æc febris, quantum ex se, periculo vacat; vbi autem in curando aberratum fuerit, facile in cachexiam, aut hydropem, degenerare potest.

Quàm longa cōsuevit elice. Longa item consuevit esse; & quò plus pituitæ, crassioris præsertim, subest, tantò euadit longior, ita, vt quandoq; ad 2. 14. 20. 40. paroxysmos ascendat, quandoq; ad dimidium annum duret, velut ea, quæ Gaileno

leno loco citato describitur. Autumno con-
pulle, atq; in Vere primū defisse.

Longitudinem portendunt, præter Longi-
tudinem stabilem cruditatem, sudor frigidus dinem
in fine accensionis prodicens, 4. Aph. 37. quæ por-
tendunt.
Pulvis durus permanens; idemq; paroxys-
mi tenor perpetim observatus: Contra, Brevis
breuitatem pollicetur, si non longè à prin- tem verò
cipio morbi minores, mitioresq; fiant pa- quæ pol-
roxysmi; lotium verò sedimen aliquod o- liceant
stendat; & pulvis ex duro in mollem per- tur,
mutetur.

Curatio.

Quò plus phlegmatis bili admissum est, Curatio
eò ad quotidianam febrem magis verò in quo
gens, ab exquisita tertianæ therapia lon- cōsistit.
gius abest; è diuerso ad hanc propius accen-
dit, quo pituitæ portio minor est. Nos iux- Cura vn-
ta Gal. doctrinam curatè illam docebimus, de auspi-
in qua pituita abundat: Vbi quoniam in- cōsta iux-
testuna, venæq; melatareæ, copia eius hu- ta Gal.
moris laborare solent, initium iumentum doctrinæ.
suum a leni innocentis succi euacuatione:
quod aut sequemur clystere, pharmaco, vel
viroq;

Clyster acrior sit oportet, quàm in ter- Clyster
tiana, ut qui componitur ex qualis ef-
fic debeat.

X)

De cō-

De febr. biliosis

Decocto maluz.

Absinthij,

Bete,

Parietarie,

Mercurialis,

Chamemeli,

Furfurum in linteolizatorum, cum

Melle rosato,

Oleo chamemelino,

Violato, vel

communi, addita portione aliqua
hiere, & salis.

Elysinas

est toto

morbi

decurfu

per inter-

ualla tri-

duana vs-

tendum.

Simplicia

or & do-

mesticus

elysterve

parand9.

His toto morbi decursu per internalia tri-
duana vtiliter vtemur, si alius pignor, & nou.
scabundus ad medicamēta faciat agrotus.

Simplicior isto, atq; domestic9 paratur ex

Decocto betæ,

Chamemeli, in

Iure carnis; aut

Aquā cum oleo, & sale. Aut:

Decocti herb. emell.

Centaurei min.

Parietarie lib. j.

Sacchari rub. vnc. iij.

Olei Chamemelini,

Anethini,

Lilior. alb. an. vnc. j.

Salis modicum, Millec & fiat ely-

lma.

phar-

Lib Caput xii.

41

Pharma un esse queat (ægro clystma a
versantes præteritum, si prima corporis regio
fecit impunitior)

Pharmas
cum qua-
le a gro
propinā-
dum.

Manna,

Lassa cum specieb. hiera, aut

Tincturam de hiera, vel diaphenico.

Syrupus ros solut. cum infus. agarici.

Syrup. diatreos,

Laxativus Fernelianus, &c.

Dilutum rhabarbari, &

Fol. senæ,

Pil. de rhabarbaro,

de Hiera,

Pulvis radicum mechoacane, cum

Specieb. aut electuario diatributh, cum

Rhabarbaro, & iusculo quoq.

Verum hæc inter initia parcius exhi-
bentur; quoniam, ut monuimus, febris ista,
repetitis, lenioribus tamen, medicamentis,
tolitur; quibus paulatim semper aliquid
adijciendum est. Leniorem verò purgatio-
nem, ante perfectam morbi coctionem, in-
stituere haud licet, coctionem autem virga
monstrabit, ac tum demum cum natura vel
nullam, vel imperfectam, aliquam excreti-
onem attentabit.

Pharmas
cis circa
initio
parcius
utendū.
Purgatio
ante per-
fectam
conco-
ctionem.
improbatur.

Ubi ventriculus, & intestina, repur-
gata quadantenus fuerint, non repugnan-
te vel

Corporē
purgato-

Yy 2

te vel

De febr. biliosis

vena se. te vel ætate, vel virtute, vena secabitur,
ganda.

Preparat.
tib. ante
purgatis
onem.
utendum
quib.

Deinde, quia crassus humor citra præ-
parationem intractabilis subest, & coneo-
quetur, & expulsionem ritè accomodabitur,
incidentibus, &, absq; vehementi calore,
attenuantibus, primò leuionibus, vt sunt:

Syrupus acetosus,

Oxymel simplex,

Syr. de duab. radicibus,

Mel rosarum cum aqua, aut decocto
endiuiæ, foeniculi, capillorum Veneris, agrimonie
vel:

℞. Radic. aperientium in aceto pri-
us per 24. horas infusarum, & resiccatarum
in umbra vnc. vi.

Cichorei,

Acetose,

Origani,

Betonice,

Endiuiæ, an. M. j.

Abfinthij Pontici, M. f.

Sem. frigid. maior. drach. vi.

Sem. anisi,

Foeniculi, ana drach. j.

Liquiritiæ rase vnc. f.

Flor. violar.

Rosarum,

Boraginis,

Geniæ

Lib. Caput **xvii.**

42

Geniste.

Amhos, anap. j. Fiat deco-

*ctio in f. q. aquæ colaturæ cum albumine
oui clarificato.*

℞. Oximell's simpl. lib. j. f.

Syrupi de duab. radic. an. vnc. ij.

Misce, & f. V. doses.

Cum per aliquot continuos dies ista
fuere exhibita, medicamentum purgans,
vnum de superioribus, aut huiusmodi
propinabitur.

℞. Rhabarbari electi drach. ij.

*Spice scrup. f. infusorum in aq. cicho-
rij q. s.*

*Agarici in oxym. cum pauco zinzibere
infusi drach. j. Expressioni adde*

Elect. diaphœnici drach. iij. f.

Mellis ros. solut. vnc. ij. M. f. potio.

Materia porrò febris istius ob lento-
rem suum, neq; simul concoqui, nec vacu-
ari potest, proinde repetenda sunt utriusq;
generis pharmaca.

Præparationis gratia superioribus ad
iungemus syrupos valentiores; qualis Bizan-
tinus, & de quinq; radicibus, appellat. Gal. loco gratia ad
citato cap. 8. propinat mulsam, cui incoxe-
rint origanum, hyssopus, spice, sicut etiam uti-
tur cremore ptisanæ piperaio. Verùm id fa-

Pharma-
ca vtrius-
que ge-
neris res
petenda.
Præpara-
tionis
gratia ad
iungens
di syrups
valenti-
ores.

Y y 3

cit non

De febris biliosis

cit non in omni tertiana spuria. quemadmodum rursus insinuat ad Trallianum, sed in ea solū, quæ quālongissimè & tertianæ exquisitæ conditionibus abest.

Vomitus
maximè
est circa
cicæ.

Vomitus in hoc morbo tantæ est efficacie, vt huius solius beneficio, plurimos a febre procius vindictos nouerit Galenus. Potest verò cieri in initio, vel infestante nauica in fine paroxyimi; aut, quod securius, & vtilius est, ab assumpto cibo.

Vomitores
ia.

Fluentibus coctionis signis vrinæ & sudores euocandi.

Vomitum erit multa in qua coctus fuerit raphanus, semine eius, aut hyssopus.

Interea elucetibus manifeste coctionis indicijs, vrinis, & sudoribus, euocandis, obiter opera dabitur, ea ferè ratione, quam in præcedenti capite dedimus.

Diureticis non malè adijciatur cicera, radices apij, petroselinum, rutæ undorum, asparagi.

Quid Gal.
post
propinat

Galenus post septimum, seu, quod idem est, post signa coctionis quæ hic ante id temporis ferè nulla solent conspici, alutam absinthij valde probat.

Non remittente morbo in-
terfouenda.

Quinetiam nisi morbus vltro remittat, hypochondria confouere expediet per spongiam, vel linteā inuiccatā decocto rad. apemrenium, chamæmeli, absinthij, seu lini, & fennigraeci.

Et post

hepatu
aut ugi
abiuto
ceræ n
he
gerere
conuer
lini o
chino,
M
clasis
respuat
fumane
latus p
cinnamo
H
dvicrali
bur vlt
serua r
Pontici
quotid
ter. Bo
T
D
Al
alterna
caupio

Lib. Caput xii.

42

Et post fomentum inungere regionem Post for
hepatis lita ex oleo amygdal. amararum, iugo, mentum
aut uguore filiarum enatula, ac paulillo aceti, in ingra-
abiuto, cum dupla quantitate olei nardini, & dar-gio
ceræ modico. hepatis.

Eodem pacto ventriculi quoq; curam
gerere oportet, potestq; is fetu quo optiam
conueniente præmisso (de quo suo loco)
lini oleo absinthiaci, de mentha, mali-
chino, &c.

Medicamenta intrò sumenda huius Me ficas
clasis sunt recentis syrapi; quòd si dulcia menta in-
reispuat æger, ei rectè præbueris dilutum terna
fumaria, aut radicem cichorei decoctum in sero q. a.
la. tis paratùm, ventriculi graua nonnihil
cinnamomi, aut piperis, adijciendum.

His ita peractis, ventriculi, & hepatis, Vtrien-
dificralia commodùm emendabitur, & ro li & he-
bar vicentibus inus conciliabitur, tolo è con- pati: dy-
serua ros. & betonica, vel conserua abfiniky scrafia
Pontia, et sel. pampinula Italica, compositio, corrigè-
quotidie accipiendo pro dosi vnc. i. circi- da.
ter. Boli vices iubeunt:

Tabella vna, aut altera, diarrhodon

Abbat.

Diatrion fantalen,

Aromatic. rolat., Gabrielis. Vel
alternatim, vel mixtum, aut coniectua rolat.
exipiendo: vt

8.

De febribus biliosis.

℞. Conseruæ ros. drach. ij.

Aromatici rosati scrup. i.

Diarrhondo Abbatis drach. f. Cum

Syrupo de corticibus citri, f. mixtura.

His substituuntur :

Trochisci de rosis.

de eupatorio,

de absinthio, an. scrup. j. In

formam pilularum redacti, saporis gratia,
superbioëdo haustum a que cichorei, vel deco-
cti hordei, aut foeniculi.

Quæ ter-
tiana cir-
cuiens
prohibea-
tur.

A peculiari, & occulta proprietate, ter-
tiana circuitus prohibere creduntur illa; vñ
quod celebrat Myreplus; & habet :

Succi plantaginis vñe. ij.

Aceti vini albi vñe. j. Detur calidum
duabus ante paroxysmum horis. Item huius
tertia prolatione plurimos tandem conua-
luisse vidit Alexand Benedictus :

℞ Succi polygonati,

Rad. plantag. an. vñe. j. f.

Cuscute,

Sem. sinapi albi, an drach. j. Feruesca-
to, & colato, succo, adde sacchari q. s. est
ad edulcorandum.

Quò pertinet pulvis radicum gentiane,
aut qui efficacior est, succus earundem; vel
pulvis cardui benedicti ante accessionem alsu-
ptus. Aut :

Lib. Caput xii.

45

Cent. minoris,

Scelopendrij, an. M. j.

Passularum,

Liquiritiz, an vnc. j. Fiat decoctio in

f q aqua, quantum oya ad duntiem bullire solent. Colatura dulcescat sufficienti saccharo. Capiat aliquoties die febricitationis, hora vna, & altera, priusquam exacerbatio ingruat, vnc. iij. circiter.

Ad hæc aqua stillatitia, quam Becherus tertianam notat, & quartanam, haud dubie extirpare, prodijt:

Cent. minora,

Cardui benedicti,

Penihaphylli, ana M. ij. Incidantur,

& in sero lactis caprini macerentur per noctem: deinde in B. M. destillentur. Da huius in aurora vnc. iij. vel iij. Instante paroxylmo itidem.

Alij hoc, ex Auicenna deprompto, videntur:

Yng. populei vnc. j.

Tela araneorum, à pulvere mundate,

drach. ij. Mis. Fiant globuli, vel pa-

stilli, seu trochisci, temporibus, & carpiis manuum, alligandi.

Vulgò cupas licet, linteolo inuolutum, vel araneis, testa nucis inclusum, & collo suspendit.

Z z

Victus

De febribus pituitosis

Victus

ratio qua
lis.

Victus ratio, attendentes causæ antecedenti, minùs refrigerans hic competeit, quàm in tertiana exquisita, sed ad aliquam caliditatem declinare debet plùs minùs, pro paucitate, aut copia, phlegmatis, quod bili iungitur.

Aër cu-

biculi

qualis es-

se debet.

Cibis qui

bus ve-

secundum

Quanta

dosi edu-

lia offe-

renda.

Hinc aër cubiculi minùs æstate refrigeretur, alijs temporibus ad temperiem declinet.

Ciborum genera, quibus licitè vescuntur, in præcedenti capite recensita fuere:

ijs tamen condimenti loco piper, semina feniculi, petroselinum, hisq; affinia, rectè miscemus. Maiori etiam quantitate edulia offeremus, ob morbi longitudinæ. Et quamvis Gal. alternis tantùm diebus cibum præbeat, nostræ tamen regionis corpora, ob aërem, & consuetudinem, hic non tolerant.

Potus

qui anti-

quies.

& qui ho-

die vsur-

patur.

Die qui-

eus de

ambulas-

io con-

ducit.

Potus antiquitus erat aqua mulla: nos hodie damus decoctum cinnamomi solùm, vel cum radicibus cichorij: vel decoctum hordeij cum pipere, vel cinnamomo, vel feniculo, vel aniso, concinnatum.

Conducunt etiam die quietis deambulationes, & corporis frictiones.

Somni mediocritas; Alius liberior; Animique quies, & alacritas, hic valde sunt necessaria.

CAPVT XIII.

De

De febribus pituitosis; ac
primum de quotidiana
continua.

DE pituitosarum febrium classe meritò
primum locum occupat quotidiana
continua, velut ea, cuius fomes, pituita vi-
delicet, in maioribus vasis computrescit.

Et hæc varæ sive pituitosi humoris dif-
ferentia; nam alius dulcis, alius acidus, a-
lius salis, audit; nemq; horum alius a-
lius crassior, tenuior, viscosior, &c. depic-
tendatur: nos tamen, ut longum, ita quoq;
superuacaneum arbitramur, hæc singillatim
persequi, ac proinde, exempli loco, eam fe-
brem curare docebimus, quam dulce phle-
gma putrescens excitat; quando quidem ut
si bus à pituita salta tractanda sit, ex capite
de causâ spurio propemodum liquere po-
tess. in reliquis autem pituitæ differentiis,
quæ sæpius quoq; intermittentes, quam con-
tinuas, pariunt, id vnum ferè cōsuetudine de-
cet, ut frigidiori calidiora, magis extenuan-
tia, &c. viscosiori, quæ efficacius tum inci-
dant, tum abstergant, remedia opponantur.

Pituita igitur dulcis, si quando in ma-
ioribus vasis putret, febrem profert Auicena

Hunc fe-
brem pi-
tuita in
maioribus vas-
is putres-
cens ge-
nerat.
Quot
differenti-
æ pitui-
tæ.
Phlegma
dulce pu-
trescens
hanc fe-
brem ex-
citat.
Acida &
salis pitui-
ta inter-
mittentes
sæpius
quàm
continuas

De febribus pituitosis

as pari-
unt
Febris
hec Aui-
cennæ
latice di-
citur.
Curatio
huius &
hecticæ
diferes
pat.

Causæ
internæ.

Causæ
externæ.

Signa hu-
ius febris.

Calor hu-
ius febris

næ (j. quarti tract. 2. cap. 46) eiusq; se-
clatoribus, laticam appellatam, quia occul-
ta sit, & intus delitescat; quæq; Medicos
minùs peritos, ac circumspectos, sub hecti-
cæ larua sæpenumerò decipiat, atq; in pe-
riculosum errorem præcipientes agat, cum
hecticæ curatio ab huius curatione toto
(quod aiunt) cælo distet.

Causa.

Causæ internæ humoris pituitosi feraci-
ores sunt, temperamentum, vel totius,
vel hepatis, aut cordis frigidius, atq; humi-
dius, seu nativum sit, seu usu, aut simili ratio-
ne victus, tale efficiatur.

Externæ, crapula, ocium, balneum à
cibo, Hyems, vel aliàs humidus cœli status.

Signa.

Signa quotidianæ huius sunt: inuasio si-
ne horrore, rigore frigore; & quod nun-
quam ad plenam, puramq; intermissionem,
aut apyrexiam, peruenit; tametsi à meridie,
& circa vesperam, nonnihil mitescit, sub
occasu tamen Solis, atq; noctem, rursus ex-
asperatur.

Calorem tactui exhibet mitem, blandum,
velutiq; halituolum, qui tamen, ubi paulò
diutius

diutius contrectaueris, acrimoniæ aliquid imitis. præferat, sed multò minùs quàm hectica. *Vrina*

Vrina initio est lucida, vel saltem *qualis*. decolor; & nisi quid humoris simul excernitur, tenuis, quæ tamē, progrediente morbo (si ad meliora, non deteriora, mutatio fiat) rufedinem contrahit.

Pulsus est mollis, latus, inæqualis. *Pulsus.*

Aegri à calefacientibus, quàm refrigerantibus, meliùs habent.

His accedunt ea, quæ pituitæ abundantiam in corpore arguunt, veluti, vomitus, & deiectiones humida, cruda, aquosa, pituitosa. Præcordia item, ultra naturalem *Præcordia* habitum, humida, & distenta. *dia.*

Pallor albidus. *Colour*

Intemperies corporis frigida, & humida. *Intemperies.*

Aetas puerilis, vel senilis. *Aetas*

Febres eiusmodi vulgariter grassantes; ac cætera, quæ ad causas externas retulimus.

Internoscitur porrò hæc febris ab hectica, quoniam in hectica, (quemadmodum suo loco fusiùs dicemus) calor est a nobiscatur hæc febris ab hectica. *Quomodo interscatur hæc febris ab hectica.*

sani hominis vrinæ proximum: pulsus diffus, & angustus: rarò per se inuadit, sed febrè alias febres excipit, aut ipsam copulat.

De febribus pituitosis.

tur præcesserunt causæ calefacientes, & exsiccantes: tandem etiam leuantur à refrigerantibus, atq; humectantibus.

Prognosis.

Cum Galenus quotidianam intermitterentem periculo haud vacare asseuerauerit, de arte curat ad Glauc. cap. 7. id multo potius de continua fuerit sententia: Soluitur plurimum diarrhæa, & sudoribus. Subinde tamen etiam in cachexiam, & hydropem, migrare conuevit.

Curatio.

Solutura
diarrhæa.
la quos
morbos
aliquam
do mi-

grat.
Scopi cu
rationis.

Calefa
cientibus
magis
quàm fr
gorificis
utent
dum.

Curatio.

Scopi curationis sibi inuicem aduersantur. Nam febris morbus frigida humida; causa febris pituita calida, & sicca, postulat. Præpollet nihilominus quàm causam huc suggerit indicatio, suadetq; ut moderatè calefacientibus, magis quam frigoricis, utamur, cum morbus aliter, urgente scilicet, ac perseverante, quæ ipsum fouet, causa, curari nequeat. Hunc igitur cum amoliri sit animus; calidiusculis, (ut diximus) incidentibus, atq; tergentibus, rem aggredi oportebit.

Curatio, nisi virtus repugnet, & atas,
à venæ

à venæ sectione sumet initium, lenitâ tamen prius aluo, & absterſi, intellinis, atq; ventriculo, quæ partes, ſub febre iſta, multo phlegmate redondare ſolent.

Proinde parabitur clyſter ex

Clyſter

Decocto herbarum emollientum; vel

ex quib. herbis parandus.

Aqua muſſa, cum melle roſato, ſaccharo rub. elect. lenituo; vel

Caffia pro clyſteribus, ſale, oleo chamæmelino, & liliorum alborum.

Per os glutietur bolus ex caſſia, & hiera; aut concinnabitur hauſtus cum melle, aut ſyrupo roſ. ſolunio, manna, &c. decoctio propinanda. Per os qualis

ſem. aniſi, vel ſæniculi, ſolutis.

℞. Aquæ muſſæ lib. j.

Mellis roſati,

Sacchari, ana ꝑnc. j. ſ.

Caffiæ pro clyſteribus drach. vi.

Olei chamæmelini,

Liliorum alb. an ꝑnc. j.

Salis drach. j. Miſ. F. clyſter.

Vomit,

Vomitus, cum naulea viget, neq; ad ſuperiores purgationes ineptus eſt æger, cieri queat

Muſſi,

Oxym. ſimplici, vel

Syrupo acetoſo ſimplici,

Diluo hordei,

℞.

De febribus pituitosis.

Prima
corporis
regione
sordibus
carente
vena re-
gionem
aut.

Decoctionibus seminū raphanī;
Atriplicis.

Quòd si prima corporis regio nihil istarum
sordium (sicut in nostra præsertim regione
rarissimè accidit) contineat; adeoq; depu-
ratione eiusmodi haud indigeat; ita-
tim prætermittis alijs omnibus, vena re-
gionem debet: inde ad præparandam, &
concoquendam morbi materiam accinge-
mur, ab ijs, quæ leuius, tum incidunt, tum
aperiunt, tenuant, atq; abitergunt, incipi-
entes, qualia sunt;

Oxymel simplex,

Mel rosatum simplex,

Syrupus de betonica,

de corticib. citri, cum aqua, vel

Vbi febris uere betonica, rad. feniculi, capill. Veneris, &c.

Vbi febris est vehementior, & putre-
do maior, Oxysaccharum, syrupum de endiuia,
aquas refrigerantes, cichorii, endiuia, graminis,
&c. opportune adijciemus.

In progressu morbi proderit exhibere

Oxymel compositum,

Syrupum de duabus

de quinq; radicibus; quorum
vicem expleuerit mulla, in qua coxerit be-
tonica, vel quid simile, ad parandam pituitam.
Idaneum: aut apozemata, cuiusmodi in præ-
sensu casu componuntur ex radicibus

latur
lacc
quo

feli
pur
ac c
rem
uen
sunt
Atr
ra v
mul
Aph
bum
E
vel

sem
mac

Lib. Caput xii.

49

Radicibus foeniculi,

Cichorei,

Graminis,

Chordeo integro,

Betonica,

Vuis passis,

Seminibus foeniculi,

Seminibus frig. maioribus; Sic ut con-

latur ius, & cum oui albumine decolatum,
iaccharo iniecto, vel dictorum syruporum
quopiam, edulcoretur.

Elucens deinceps coctionis mani-
festioribus indicijs, à lotio petitis, plenior
purgatio instruetur; nisi natura spontino,
ac citico, illi fluxu, sudore, aut abcessu, e-
ruptente, conatum Medici salubriter præ-
uenerit. Nam quæ iudicantur, & iudicata
sunt integrè, mouere non oportet, ex do-
ctrina Hipp. j. Aph. 20. At verò cum natu-
ra vel segnius, vel prorsus non expellit, sti-
mulo habet opus, & adiumento Medici, per
Aph. 21. citatæ sectionis. Quocirca purga-
bimus

Elucens
tibus ma-
nifestio-
ribus sig-
nis ple-
niori pur-
gatione
opus est.

Elect. Diacatholico, cū diaphoenico, aut jndo; Quibus
vel horū alterutro cū inuso agarici in oxymelle. purgan-
tibus pur-

Item inuso agarici, rhubarbari, fol. sene,
seminum caribami, cum cinnamomo, squinantho,
mace; in aqua betonica, sumaria, &c. addito
gandum.

A. 44 Sympo

De febribus pituitosis

Syruporos. solutius, & elect. dictorum quopiam.

Virtute
 fberilla
 existente
 quid faci
 endum.
 Inclinan
 te morbo
 sudores
 & vtina
 cienda
 sunt:

Cum virtus est imbecillior, quam vt
 semel, atq; confertim, factam euacua-
 tionem perferat; apozem. de materia mitior
 rum cataractarum parabitur, & de his aliquot
 vel cōtinuis, vel interpolatis, propinabitur.
 Post hæc, inclinante iam morbo, & probè
 e purgato corpore, vrinis, atq; sudoribus,
 euocandis danda erit opera. Diuretica hic

Diuretica

Decoctum rad. asari,

Rad. aperientium;

Cicerum rubcorum;

Buttatum alkekengi;

Emulsiō & seminum frigida in diol.

ex aqua. petroselinæ, adiecto syr. acerb.

tonica.

Sudorific.

Sudorifica censentur: decoctum Gula-

Tonus

ficæ incinnum dilutius, aut rad. apij, ex aqua. melle-

morbi de

sa facti. Tonus porro morbi decurru, ma-

curfu

gnæ ratio ventriculi, aliorumq; naturalium

quid fac

viscerū, habenda, quoniam alioquin sub hoc

ciendum

febris tempore pituitum patiuntur: igitur

Intus

tu instaurandis proderit

Intus

Conseruatio &

Intus

Flor. britonice,

Intus

Corium cūri, cum

Intus

Speci. b. diarrhodon Abbatis;

Intus

Diatri.

Lib. Caput xii.

50

Diatrion sancta'ou.
Aromatici ros. Gabriellæ.

Foris inlingetur venter

Oleo mastichino,

Absinthio,

Cydoniato, cum tantillo olei sil-
laurij, macis, & nucis moschata.

Foris in-
lingetur
venter.

Diæta eiusdem generis hic competit, **Diæta**
quæ in intermittente, de qua mox, nisi quod qualis ef-
tenuiore esse debeat, minuiq; caletaciens, le debet.
Illud imprimis sedulo efficiendum est, Alius ni
ut nisi alius vltro quotidie deponatur, præ vltro
sertim si illa excrementa putrida natura depona-
pellere cæperit, clysteribus communibus, & do- tur suba-
mestien, appellatis, subducatur. ducenda

C A P V T XIV.

De febre quotidiana inter-
mittente.

Quotidiana intermittens materia non. Internit
discrepat à continua; nam etiam hic tens lo-
pituita dulcis (de qua sola in presenti quo co non
que capite sermo habebitur) putredine cõ. materia t
taminata: sed solo putredini loco, quoni cõtinua
am in illa el extra vasa, vel extra maiora discrepat
saltem, pituitosus humor exardescit, quem
Admo.

De febr. pituitosis

à modum supra in tertiana periodica asse-
uerauimus.

Causa.

Causæ
internæ
& exter-
næ quæ.

Causas tam internas, quam externas eas-
dem prorsus, quas continua, agnosci;
omnia videlicet, quæ phlegmatis copiam in
corpore producant, quorum iam antè me-
minimus.

Signa.

Signa hu-
morem
huius fe-
bris pro-
deñtia.
Color.
Pulsus
Excreta
Urina.
Somnus
Insom-
nia
Mens, &
sensas.
Inuuantia
Et æden-
tia.

Signa quædam humorem hunc in corpore
pre dominantem, quædam febrem ipsam
produunt. Priora desumuntur ex colore
vultus, & corporis, albedo, interdum plum-
beo, vel liuido; habitu pingui, & obeso;
pulsu molli; excretis per os, nares, aluum, hu-
midioribus, ac pluribus; urinâ nunc tenui,
nunc crassa; somno profundo, & graui; in-
somnia aquæ, pluiiarum, niuium; grandia-
nis, balnei; motu corporis segni, languido;
mentis stupore; sensuum hebetudine; à iu-
uantibus item calidis siccis, phlegmagogis,
vel pituitæ spontanea euacuatione; sedenti-
bus vero contrariis.

Signa
hanc fe-
brem in-
dicantia.

Posterioris generis, quæ febrem nempe
eius characterè obignat, sunt hæc: Inuatio
lineæ horrore, aut rigore; sed cum frigore
extrema.

extremarum partium, nasi, manuum, pedumq;. Hinc sequitur calor neq; magnus, neq; statim aeris primum ad tactum, sed interiecta demum mora aliquid acrimoniae præferens, & summè inæqualis, quasi per cribrum, aut colum (ait Gal. j. de arte curat. ad Glauc. cap. 7.) transmissus, hoc est, alicubi plenius, alicubi intercilè, nunq; plenè, tactum feriens. Idem tardè, atq; inæqualiter per corporis ambitum sese expandit: quoniam videtur subinde emicare, subinde rursus opprimi, haud aliter ac ignis sub virentium lignorum cumulo, velut eluctans; quod non solum sub inuasionis initium, sed reliquo etiam paroxysmi tempore, accidit, nam humor pituitosus difficile accenditur.

Nunquam præterea febrilis æstus eo usq; hic exerescit, ut situm inferat, aut ægritudinæ cogat abijcere.

Adhæc, tanta in somnum ad est pro-
pensio, ut veterino subindeprehendantur.

Urina in principio morbi vniuersali tenuis, alba, aquosa, funditur: ni scilicet aliquid nocentis succi simul effluat; alioquin crassa, & turbida, apparet. In progressu declinat ad rubedinem, cum crudus pituitæ succus vltiore elaboratione in sanguinem permutatur.

A 2 2 3

Puls

In som-
num pro-
pensio
Urina in
principio
tenuis,
alba, a-
quosa est.

De febr. pituitosis

Pulsus.

Pulsus est parvus, debilis, inæqualis, initio accessionis, in augmento maior, vehementior, celerior: simpliciter tamen, si aliarum intermittentium febrium pulsibus conferatur, minimus.

Paroxysmus quatus.

Paroxysmus ad 18. horas communiter extenditur, atq; intervallum multò quàm alia intermittentes, habet impurius, minusq; integrum; adeò ut vix unquam eos febris perfectè relinquere videatur: desinit verò abiq; sudore præsertim inter initia morbi.

Reversio eius.

Quotidie reuertitur, idq; sub vespérâ. Sed quoniam & duplex tertiana, & quartana triplex, pari ratione quotidie inuadunt, ad alia istarum febrium signa partim tradita, partim in posterum tradenda, ni velimus decipi, confugere oportet. In quotidiana siquidem omnia signa, & symptomata, pituitæ, veluti in duplici tertiana bili, in triplici quartana melancholiæ, attestantur.

Quomodo per paroxysmos hæc febris à duplici tertiana

Paroxysmi insuper quotidianæ omnes inter se sunt similes; secundum caloris motum, quantitatem, qualitatem, & reliqua symptomata: nisi quod, more aliarum febrium intermittentium, aliquando (ut plerumq; apud nos) perpetuò anticipent, ali-

quant.

Lib. Caput xii.

52

quando tardent; & quod materia morbi ad coctionem tendente, quemadmodum in ceteris quoq; salubribus morbis visuenire assolet, de magnitudine, & vehementia, remittant.

& quartana triplici diffinitur.

At in duplici tertiana (de quartana triplici idem omnino sentiendum est) evidens paroxysmorū dissimilitudo deprehenditur: ita nempe, vt paroxysmus tertius, quintus, septimus, & reliqui, diebus imparibus innadentes, calore, alijsq; symptomatibus, sicut scilicet, vomitu, amaritudine oris, dolore capitis, &c. primo paroxysmo respondēant, quartus autem, sextus, alijsq; paribus repetentes, secundum planē repræsentent.

Duplicis tertianæ, & quartanæ triplici paroxysmi inæqualiter & dissimiles.

Præterea, quemadmodum in quotidiana excretionē pituitosæ, sic in duplici tertiana biliosæ, in quartana triplici melancholicæ, deprehenduntur.

Excretionē.

Certior etiam coniectura quotidiana noscitur, si tum temporis eius generis febres populariter grassari soleant.

Item, si, quamprimum hominem febris aggreditur, præcordia fuerint distenta, inflata, & tumida.

Præcordia distenta, inflata, tumida, signa.

Si autē, & in ipso etiam morbo, facies albet, sublivida, aut suburgida est.

Stomach.

De febr. pituitosis

Stomachus diu imbecillis ; cibi fastidium ; & frequens ractus, præcesserit.

Prognosis.

Febri hæc, Gal. affirmante, cap. 8. j. de arte curat. ad Glauc. non caret periculo, cachexiæ videlicet, aut hydropis, propter obstructions hepatis, & lienis, aut scirrhus eorundem.

Diuturna est, & quò sincerior, eò diuturnior ; nec facile remedijs vincitur, ac si nè ventriculi insigni noxa vix accidit.

Pituitæ

venit

si em

lucisfacit

Bene sperandum, si, inchoante paroxysmo, pituitæ vomitus vltro sequatur, & declinante copiosū fundat æger ludorem.

Si tempus interualli habet ex toto à febre liberum.

Febris

hæc rar

issima

Quotidiana verò febris intermittens, omnium intermittentium est rarissima.

Curatio:

scopi cu

tuonis.

Copi curationis iidem profus sunt cum his, quos in præcedenti capite quotidianæ continuæ præfinimus, incidere videlicet, absolvere, attenuare, & nocentem materiam quaquaversum expurgare, nisi quòd hic

Lib. Caput xiv.

53

hic validioribus, calidioribus pharma-
cis agere licet.

Phlebotomia hic rarissime habet lo-
cum, nisi venæ fuerint crassiores, & sangui-
ne turgant. Reliqua medendi ratio cum
illa, quam continuæ quotidianæ assigna-
uimus, ferè cõincidit.

Ac proinde initium faciemus aluum Enema
subducendo enemate ex

Decocto betæ,

Malvæ,

Mercurialis,

Chamomillæ, cum melle rosato,

ex quib9
plantis
paran-
dum.

oleo, & sale, &c. vel ex iure galli veteris, parato. Potio
Postridie portulaculam præbebimus dissolu-
to elæctuario diacatholico ex ag. mulsa cum melle. qualis
le rosato solutum, & tantillo diaphænici: aut bo-
lum comparabimus è cassia, & hiera simplici; et quan-
do danda
vel pilulis cochis in tenui iure solutis. Bolus.
Pilulæ.

Inedia magno in præsentia emolu-
mento est, ac vices euacuationum subit, hac febre
per Aphor. 62. & 63. lect. 7. & 2. Aphor. 10. vices eu-
cuatio-

Vbi nautcabundus, & in vomitum nis subit.
pronus, est ager, prætermisiss alui purgati- Vbi ager
onibus: per superiora pituitum educere nauicæ
conabimur, eo pacto, quo in præcedenti bunda est
capite sciendum esse monstrauiamus. per supe-
riora pi-
tuita vas

Deinde alteram in coctioni phlegma-
tis cru-
cuan-
da.

B b b

De febribus pituitosis.

**pituita
cruda
conco-
quenda**

tis crudi, & euacuationi, opera dabitur; ita videlicet, ut interiectis aliquot diebus, sapide quiddam, & blandum, cataceticum exhibeamus; Vtriusque sequuntur lib. 12. cap. 7. qui in hoc humore manet semper partita vacatione VII, quoniam pituita etiam cocta crassitudinem non amittit, & ob id forti medicamento sollicitata, laboriose educitur.

Oportet autem in praesenti etiam casu paulatim a leuioribus ad generaliora tum coquentia, tum vacuantia, gradum transire.

In classe concoquentium, praeter enumerata, collocantur:

Aqua mulsa, aut saccharata, cinnamomo condita; vel

Ius pulli, decoctionis cicuri, radicumque petroselinii, hyssopi; vel

Ius apij, & cicuri, addito, aut statim post assumptio, premissoque, saccharo drach. j. pondere circiter; vel

Aqua mulsa, in qua concoquetur palegium, betonica, thymus, hyssopus; vel

Semen anisi, fenniculi, saccharo incrustatum; aut

Confectio alarhodon Abbatis.

Aroma.

Lib. Caput xiv.

54

Aromatici ros.

Efficacissima sunt:

Oxymel compos. necnon &

Syrup. de quinq; rad.

Oxym. scilliticum.

*Coi co-
quentia
efficaci-
ora.*

Cui porro syrupi acetum recipiunt, paul-
xilla mastiche, atq; glycyrrhiza, calligari
debent, ne ventriculum, hic alioquin noxæ
expositum, aliasq; partes nervosas, crebri-
ore vlu offendant.

Purgantia conveniunt:

Polypodium,

Carthamus,

Aloe,

Turbit,

Agaricus,

Oxym. cum agarico; cuius solius vsuro

patione diuturnæ febres percutantur.

Elect. Diaphanicon,

Elect. Indum,

Pilule de agarico,

De hiera cum agarico,

Cochia;

Aggregatiue,

Auree;

*Pulvis ex agarico, & zingibere; vel illo, &
cinnamomo, & quib; partibus: cuius tertio,
aut quinto quoq; die vicino rã rã drach j.*

bbb z

ex mel-

De febribus pituitosis

ex melle ros. propinari queat.

Pulvis
purgans

Eodem pertinet pulvis ex turbith, cino-
namomo; vel mastiche, & zingibere, ac cinnamo-
momo vna cum turbith confectus.

Matthio-

Matthiolus laudat diluuium rhabarbari,
lus quid agarici, & fol. fene.

laudat.

Id verò cumprimis curandū, ut phar-
macis semper aliquid ventriculo familiare
adijciatur.

℞. Mellis cocti lib. j.

Aceti lib. f.

Aque font. vnc. iij.

Agarici elect. vnc. iij. coquantur ad
iustam consistentiam, expresso, & abiecto,
agarico, iterum infunde prædicto liquori
agarici leuissimi in linteo raro ligati vnc. j.
Dosis cochlearia ij circiter.

Corpore
sitè pur-
gato
quid faci-
endum

Corpore eiusmodi medicamentis iam
satis expurgato, rectè præbebimus hora v-
na ante febris inuasionem theriacæ veteris,
aut Mithridatij drach j. ex vino albo solutam.
Alii cochlear j. sinapi cū drach. j. & ij. mellis sim-
plicis ros. quotidie in aurora exhibent.

Secretū

quorum-
dā semen
nasturtii.

Quibuldam inter arcana reponitur in
hac, alijsq; febribus diuturnis, acq; etiam
quartanis, singulis diebus ieiuno ventricu-
lo vti seminibus nasturtij.

Experi-
menta

Quò spectant experimenta vulgaria :

vt,

vt, p

seu i

rium

no. A

etian

pore

mum

phana

trabit

prosp

Exi

Lib. Caput XIV.

55

vt, puluis cardui benedicti, & gentiane.

vulgeria.

Postquam morbus ad suum vigorem, seu statum, perductus est, conuenit vomitorium ex raphano, ellebori albi radicibus tran-

In v. g. g.

vomit.

tium.

xo. Alioquin leuior vomitus, velut ex

Decoctio anethi,

Chamemeli,

Atriplicis,

Sem. raphani,

Syrupo acetofo, & alij huius farinae, etiam ante statum, & quocunq; morbi tempore vomiturit æger, cieri potest, ac plurimum conducit.

Post cibum assumptum, vel ex solo raphano irritatus vtilis est, Aëtio auctore Te. trabibli 2. serm. j. cap. 86.

Assu-

pto tios

vomit.

Interea ventriculo quoq; & hepati, prospiciendum est. Illi quidem:

Quibus

pharmas

cis ven-

triculo

& hepati

prospici-

endum.

Syrupo de mentha,

de absinthio,

Confect. diatrion p'percon,

Diagalanga,

Arom. ros. Gabr.

Extrinfecus

Fomento e mentha,

Absinthio,

Mastiche,

Cinnamomo,

Ventric

culo for

menta

admo-

uenda.

Bbb 3

Galan

De febr. pituitosis

Galanga,

Caryophylli coctis in vino

& aqua.

Oleo al. sinthiaco,

Massichino,

Nardino; vel

Solo nucis moschatae stillatio.

sunt per expressionem facto. Decet verò
hec ante cibum adhibere, neq; solum ven-
triculi regioni, sed etiam octavae thoracis
vertebrae imponere.

Hepati verò robur conciliabimus :

Trochiscis de rhabbarbo,

De eupatorio,

De absinthio,

Tabulis Diacurcumae,

Dialacca &c.

Sub idem quoq; tempus, quo visceri-
bus providemus, elucetibus nempe con-
coctionis indicijs, diuretica, & hydrotica,
requiruntur valentiora, cuius generis cen-
sentur:

Syr. de quinq; rad.

Decoctum pulegij.

Origan.

Apij;

Jus cinnamoni.

Ancisi,

Rubia

Rubie tinctorum,

Glycyrrhize,

Liquor elixiri asparagi,

Fœniculi,

Betonice,

Stachados, &c.

Aër esto calidus siccus, purus, nitidus. ^{Vitius}
vel talis arte comparetur, excitato igne ^{ratio}
calidis siccis plantis, ^{Aer.} laro V. G. aut narpe.
ro, ubi eius copia, vt in Germaniæ pluribus
locis: & in fumigationibus e styrae, belxoni,
&c ita tamen, vt caput odoris vehementia
non grauetur.

Similiter cibus ad calidum siccum de- ^{Cibus.}
uergat. Hinc conuenit caro vitulina non mu-
cola, & hædina, quæ tamen saluta, roremaria
no petroselino, thymo, condiantur; lepuleuli,
aut uelle ouorum molles, pisanæ
piperata; & in prima mēla sumpta embamma.
ta e piperitide, aut radicibus petroselini tritis ^{Embama}
cum aceto, paucis amygdalis, modica crusta præ ^{mata e}
nis, & pipere, cappares ex aceto saccharato, vel ^{quibus re-}
ex aceto, & passulis, radices petroselini coctæ, ^{bus pa-}
& in modum acetarii conditæ. ^{tanda.}

Primis diebus demendum est aliquid ^{Primis}
de cibi quantitate, ne cruditas ventriculi ^{diebus e}
augeatur, & pituita in venis facilius con- ^{cibo de-}
coquatur; deinde plenius alendus est eger, ^{mendum}
aliquid. ^{aliquid.}
vt luto

t verò
m ven-
horacis
us :

visceris
de con-
rotica,
ris cens

Rubia

De febribus pituitosis

ut sufficiat postmodum rursus ad statum
vires (quo tempore semper tenuissimus de-
bet esse victus) sensim cibus detrahendus
est.

**Tempus
edendi** Tempus edendi opportunum statuitur
intermissio febris, quod quatuor minimum
horis paroxysmum præcedit, vel si tantum
spatii non conceditur, in fine saltem status.

Potus. Bibat porro decoctum piperis, aut cina-
namomi, & anisi, adijciendo aliquid syrupi de
duab. rad. Concocto autem morbo, vinum
tenue, & mediocriter potens, conceditur.

Somnus. Somnum præstat esse breuem, neq;
ulterius protrahi, quam coctioni sit satis.

**Exercitiz-
um cor-
poris an
conueni-
at** Exercitatio corporis, si per vires possit,
ut equitatio, gestatio in curru, aut lectica, ante
cibum, remissa febre, valde ex usu est; cuius
vices supplent frictiones.

**Alvus sit
libera.** Alvus teneatur libera chysteribus ex aqua
mulsa, & sale; vel decocto betæ, & mercurialis,
cum melle; & sale, paratis.

**Affectus
animi** Ex animi affectionibus gaudium, & mode-
rata etiam exanæscenæ, prolunt.

C A P V T XV.

De febre Epiala.

De quor

DE quotidianarum genere, (inquit Aëtius Tetrab. 2. serm. 5. cap. 87.) est febris, quæ à leui afflictione epiala vocatur, cum videlicet toto paroxysmo æger simul febriat, seu calet, simulq; alget, aut niget, atq; utrumq; in omni corporis parte perlentuit.

Causa.

CAusam habet (auctore Gal. 2. de diff. febr. cap. 6) pituitam vitream modicè, sed quibuldā duntaxat sui partibus putrescentem. Nam si maiore sui parte illa putrescat, quotidianam quidem febrem, non autem epialam, profert. Quod enim ex ea putret, calorem febrilem, quod à putredine immutata ne perseverat, frigus (quia pituita hæc species omnium aliarum frigidissima est) vel rigorem (si maiore impetu per partes corporis lentientes moueatur) excitare lolet. Vnde si pituita hæc amplius putrescit, rigorem præcedit quidem rigor, aut frigus, febris sequitur : verum hæc ipsa à caloris febrilis copia debellata, paroxysmo ad incrementum, & statum, procedente, sic obliuantur, ut non amplius appareat, quod tamen ab essentia epialæ est alienum.

Causæ
epialæ
pituita
vitrea.
Putrescente
pituita
calorem
febrilem,
imputris
excitat.

Causæ externæ coincidunt cum ijs, Causæ
quæ externæ

De febr. pituit.

que quotidianam gignunt; nisi quod quanto vitreum phlegma dulci est frigidius, tanto has illis oporteat esse validiores.

Signa, & Prognosis.

Signa item tam diagnostica, quam prognostica, cum quotidiana, iam detecta, habet communia, sed adhuc rarius occurrunt,

Curatio.

Curatio. Ceterum ne curatio multum euariet, præterquam quod calidiora, magisque attenuantia, tum incidentia, ac detergentia, præsidia, propter extremam humoris feb. pit. frigiditatem, crassitatem atque lentorem, hic usurpare expediat. Atque huc tamen a lentiori, à leuioribus tacto initio, deueniendum est. Ita etiam ventriculi robur non minus diligenter seruare oportet.

C A P V T XVI.

De febre Lipyria.

Lipy.

Lipyriz vocabulo complectimur eam febrem, sub qua toto vel morbi, vel paroxylmi, decursu, interiora vehementer aestuant; externæ interim partes algent.

Hanc pleriq; auctores post epialatratatæ solent; quod (vt Avic placet 4 quart. tract. 2 cap. 50.) utraq; communem iocatur materiam, humorem nempe vitreum.

Aënius Tetrab. citata. cap. 89 ex ignis sacri affectionibus, seu erysipelate, circa ventriculum lipyriz accendi aherit.

Illud sanè pro comperto haberi debet, in viscerum internorum inflammationis affectibus, seu phlegmone sint, siue erysipelata, alijsq; etiam morbis pestiferis, aut à maligna quadam materia pendentibus, frequenter extrema corporis frigere, interna vii, vt est apud Hipp. 4. Aph. 48 neq; tamen, nisi valde improprie, eiusmodi symptomata lipyriz nomine insigniri, cum etiam eorum curatio non hic inter febres, sed particulares morbos, expediri debeat.

Lipyriz febris quid.

Materia eius est pituita vitrea.

Sententia Aërii de hac febre.

Causa.

Causa igitur Lipyriz genuinæ, est bilis flaua in penetralibus corporis; circa hepatis scilicet, mesenterium, pancreas, aut aliam partem.

Causa lipyriz genuinæ in quibus

Cec 2

am pat.

Lipyriz

De febribus pituit.

cōtineas am partem extra vasa, vel in minoribus earundem partium vasis, putrescens, & pituita vitrea imputris circa lummam cutim, seu per corporis exteriorem habitum, innatans; vel (vt ait Actuarius 2. Meth. cap. j.) infarcta.

Vnde æstus interiorum, & rigorem exteriorum, Abile enim interiorum æstus, à pituita verò exteriorum perfrigeratio, pendet. Quamuis autem bilis etiam intra vasa maiora putredinem subinde concipere soleat, non putrente interim pituita, per ambitum corporis sparsa, adeòq; continuam parere nata sit; nihilominus tamen in præsentia de intermittente solum agemus; quoniam lypyria continua à reliquarum cholericarum continuarum therapia discrepantem curam non exigit.

Signa.

Signa huius febris sunt: magnus interiorum æstus, de quo ægri queruntur, & sitis inextingibiles, cum extremorum frigore.

Prognosis.

Lypyria intermittens curatu difficilis est morbus, & inter diuturnas febres numerari videtur ab Auicenna loco citato; quoniam contrarias indicationes exhibet, veluti

veluti consideranti planum euadit. De continua improprie sic appellata illud Hipp. in Aphor. supra citatum pronunciatum fuit. Item quod lib. 2. Progn. tex. 4. scribitur. Mali etiam morbi signum est, & pedes, manusq; frigidas habere, ventre & lateribus calentibus.

Curatio:

Scopi curationis eo potissimum spectare debent, ut & bilis feruor extinguatur, & illa quantocyus à corpore exigatur.

Modum, ac rationem, illud exequendi in biliosarum febrium curatione primum est reperire.

Deinceps opera est danda, ut pituita, in ambitum corporis diffusa, coquatur, atq; digeratur, adhibitis frictionibus, aut inunctionibus, ex oleis, aut unguentis, calefacientibus, resoluentibus, discutientibus.

C A P V T X V I I.

De febre diurna, & nocturna.

De febr. pituitosis

Durna febris ea dicitur, quæ de die incipit, finitur noctu; nocturna contra, quæ noctu incipit, & interdiu desinit. De utroque loquitur Hipp. j. Epid. lect. 2. tex. 16. & Gal. in Com. ibid.

Causa.

Debetq; & hæc & illa, non secus ac quotidianæ febres, originem suam præstitæ.

Signa.

Iisdem etiam aliis indicijis, quæ quotidianæ nam prodant, cognoscuntur; quorum nihilominus seorsim facienda est mentio, ad morbi euentum præuidendum.

Prognosis.

Quod igitur ad prognosim attinet, et si ambæ, quodidianarum ritu, & longæ sint, & sanata difficiles, non ab. q; periculo:

Nocturnam non admodum lethalem affirmat Hippocrates; verum hæc tum diuturniorem, tum maiorem cum vitæ discrimine iunctam, diurnam, hoc argumentum: Cum febris pituitosa alioquin sub noctem

primum

primum, pro motu, & natura peccantis phlegmatis, accessione moliri soleant, hæc verò interdum invadat; indicium sanè erit, nam aut multitudine, aut praunitate, phlegmatis, acriter stimulari.

Accedit, quòd in febre diurna neq; opportunè cibare, nec pharmaca propinare licet, nec etiam somnolentus datur, quando hæc omnia in paroxysmo, vel saltem ante declinationem paroxysmi, non permittuntur; atq; is ad 18 horas, adeoq; bonam noctis partem, producit.

Desinente accessione, cibo, potuq; reficiendus est æger, cui pleno dein ventriculo indormire haud expedit, verùm aliquando inter cibationem vigilare convenit.

Quòd si medicamentum loco cibi dare continuas, etiam illud excludet somnum; ita nox ferè integra in omnis transigenda fuerit, & vix parum aliquid diei, ante febris invasionem, quieti erit residuum.

Quocirca non immerito tales à Gal. loco citato, dicuntur vitam vespertilionum vivere.

Et ab Hippocrate in hecticam, aut tabem, migrare pronunciat, ob longiores nempe vigilas, & cibi paritatem, sub morbo adeo longo.

Cura.

In febre diurna cibare & pharmaca propinare inaequum est. Sumpto cibo in dormire non expedit.

De febr. pituitosis Curatio.

Intentiones porrò, seu scopi curatiui, iidē
in præsentia occurrunt, qui in quotidianis
na; de quibus iam satis superq; dictum est.

C A P V T XVIII.

De febribus melancholicis; & primùm de quartana continua.

Causa.

Causæ
internæ.

Causa huius febris est humor melanco-
licus, in maioribus vasis putredine con-
taminatus.

Causæ
externæ.

Externæ causæ sunt, omnia illa, quæ
de rebus non naturalibus & copiam huius
humoris parere, & putredinem conciliare,
nata sunt; quorum catalogum lege, & est in
Magnaucorum commentarijs.

Signa.

Actus

Lib. Caput xliii.

61

Afflus perpetuus quidem, sed qui quarto
queque die magis exardescat, nullo rigore,
frigore, aut horrore, præcedentibus.
Urina rubet, turbida, vel obscura est.

Afflus.

Urina.

Sitis.

Sitis autem linguæ, ac faucium siccitas,
tas, & asperitas, vigiliæ, aliaque id genus accidentia, non paulo minora sunt in præsentia,
quam in alijs continuis febribus esse solent.

Huc pertinent quæ melancholici succi
redundantiam monstrant, cuius causæ effectus
præcesserunt.

Prognosis.

Morbus hic, quemadmodum rarus, ita
periculi plenissimus, esse solet, aliorum
more, quos atra bilis peperit, cui proinde
nonnisi præmissa pretellatione manus ad-
mouebitur.

Euenire etiam consuevit; quando ca-
lidioribus, & vehementioribus, medicamen-
tis quantans intermittens ab initio perpe-
tam tractata fuit.

Curatio.

In curatione, atra bilis effervescentis re-
frigerationi, humectationi corporis; in-
cipienti crassorum mucorum, & vitum in-

Ed d

flaura

Afflus

De febr. melancholicis

flaurationi, diligenter attendendum est.

**Enema
Phlebotomia.**

Id assequemur sequentibus. Primò lenitâ aluo ex iniecto enemate, aut assumpta cassia fistula, vena (nisi quid prohibeat) sinistri brachij iecoraria secabitur.

Postea die aliquo, quem minoris afflictionis nominant, blandè quoddam medicamentum præbebitur: vt,

Medicamenta.

Diacatholicon ex sero lactis; vel Infusum senæ, rhabarbari, passularum, glycyrrhizæ, & florum cord. aîu, cum modico cinnamomi, & corticum citri: aut

Medicamenta hæc sunt iteranda.

Paratum ex syrupo violaceo multiplicis infusionis, & mannâ, cum aq. boraginis.

Huiusmodi medicamenta, velut etiâ enemata, subinde sunt iteranda. Cùm enim morbiticus humor crassus sit, & contumax, ex intervallis repetitâ purgationem, quâ si semel affatim factam, magis exigere videtur; si quidem concoctionis notæ in urinis appareant: nam alioquin irritabilis eius modi superiedere præstat.

Inter vnam & alteram purgationem quid interponendum.

Inter vnâ, & alteram porrò purgationem, præparationis causa, commodum interponem is syropeos tibiareos. de boragin; purgati. violacei, de corticibus, de acetositate, citri. &c.

Ex nco.

Lib. Caput XIX.

62

Ex neotericis quidam defecatum è po Neoteri-
mis redolentibus succum, quem pomaceum ei quid
nominant, ad eiusmodi affectus atrabilarios interpo-
nant. magnis celebrant encomijs.

Virium imbecillitati fulciendæ faci. Virium
unt, vinum, aqua aurata (seu in qua candefa imbecilli-
ctum aurum tepius reslinxeris) opimè dilu. tatem re-
tiam; distillatum item cap. num, & iucula. stauratia.

Præterea confervæ ros. rum, violarum, bo-
raginis, &c. recens, cum spec. diamar. ar. frigi. Confer-
di, atq; paxillo confectiois alker. nes. uæ.

Huc pertinent odoramenta ex ros. vi.
olis, styrace, m. scho, &c. & epithemata car. Odora-
diaca; de quibus in feb. è ardente. menta.

Vigilia, sitis, dolor capitis, vt emen. Sympto-
danda sint, similiter ex citato capite disce mata vt
re licebit. sedanda.

Victus ratio in vniuersum ad frigidum
humidum declinare debet; de cuius mate-
ria iam alias abundè. Viſus
ratio;

C A P V T XIX.

De febre quartana inter-
mittente.

Causa.

D d d 2

Mate.

De febr. melancholicis

Intermittentis quartanae materia. **M**ateria, seu fomes, quartanae intermittentis, non discrepat ab eo, qui contra naturam excitat, est autem humor melancholicus alicubi in minoribus vasis, vel extra eadem, putredinem contrahens.

Duplex est haec febris. **L**egitima sit à melancholia naturaliter putredine conquinata. Et eadem veluti fœt, & limis quidam, sic sanguinis, in lienem, naturæ instituto, per meienterij ductus, reponitur; vnde in his praesertim partibus febris quartanae legitime focus cernitur.

Spuria. Spuriam efficit adusta bilis flava, nigra, vel sanguis, vel, (vt Auicenna videtur, 1. quarti tract. 2. cap. 61.) etiam pituita. Tamen si enim haec in verum humorem melancholicum haudquaquam transire potest, potest tamen adeo crassescere, & resicari, vt primis quatuor, & consistentia, melancholiam quadamtenus æmuletur, cum Galenus 13. Meth. cap. 4. crassum humorem plus minus melancholicum esse affirmaverit. Maximè cum quotidiana testetur experientia, in his subiectis Septentrioni terris, alimento multo, & crudiori, assuefactis, albos, scirrhus, elephantiasim, quos melancholiam roborem agnoscere videtur, etiam à

Quæ à
melan-
cholia &
pituita
proveni-
ant vitia.

Lib. Caput xix.

63

am à pituita provenire. Nos de legitima quartana agere constituimus, aliquid etiam de illo spurciarum genere dicturi, quod adusta bilis genuit, cum curationem, legitimam debitam, huic applicare non liceat, nisi eam vehementer velis exasperare, vel etià prorsus immedicabilem efficere.

De legitima
causa
agendum.

De causis legitimæ tam internis, quàm externis, nihil in præsentia, quoniam illas, quamvis minùs vehementes, communes habet cum continua.

Cause
legitimæ
quartanæ.

Signa.

Inuadit primo die cum exiguo rigore, vel horrore potiùs, qui tamen rigor, morbo in statum vniuersalem procedente, aded excreuit, & augetur, ut præ frigore, cuiusmodi sub hybernium gelu etiam tanos inuadere assolet, non solum carnes, sed ossa quoque ipsa contingi, ac comminui, sibi ægri persuadent, quem senium ostocæpion Græci nuncupant.

Horror.

Calor dem nequiti multus, aut vehemens, neque tam cito, ut in tertiana, rigorem sequitur.

Calor.

Pulsus in principio paroxysmi intrò retractus, & velotingatus, deprehenditur,

Pulsus.

D d d ,

non

De febr. melancholicis

non absantis decrepiti senis pulsibus; quāvis aeger sit iuuenis: In augmento verò, & statu, velocitatem quandam, & frequentiam acquirit, comparatione tamen ad tertianam spulsiu instituta, tardus, rarusq; est, atq; multo magis per tempus interualli, seu quietis: Quinimò rarior hic, & tardior fit pulsus, quam in vltia alia febre, quam pronatura etiam agrotantis.

Urina.

Urinæ pro varietate humoris, quartanam committentis, euariatur: In legitima (vt inquit Gal. 2. de crif. cap. 4.) lub initium tenues, albæ, & aquosæ, sunt; in progessu rubicandiores, & crassiores, euadūt; nonnūquā obicuriæ, ac nigre, quæ, morbo declinante, salutare habentur.

Accessio
quā
produ-

Accessio in 24 horas producit, & 48. horis intermittit. ita vt quartanarius circuitu duos habeat dies à febre immunes.

Paroxy-
smus su-
dore me-
diocri ter-
minatur.

Paroxysmus cum sudore mediocri terminatur, non tamen id semper in principio vniuersali totius morbi accidit, nisi magna subsit plethora, & corpus alioquin ex-facili sudet.

Suspicio-
ne quart-
ana quæ
augeant.

Suspicionem quartanæ auget, si ea præcesserit, quæ melancholici iuenci prouentū in corpore faciunt: vt, victus melancholicus, & temperamentum non dissimile, vel solida

solida eiusdem humoris, aut etiam sanguinis, euacuatio, vt mensium, hemorrhoidum, &c. supressa.

Morbi præcedentes febres erraticæ, obstructions, & humores lienis, qui si frequenter huius febris, siue prodromi, siue affectæ, fieri solent.

Morbi præcedentes.

Ad hæc, si quartanæ populariter vagantur.

Signa porro alterius illius, quam illa ualida per aduersionem patit, ita cæsentur:

Signa Spuria.

Aggreditur hominem cum horrore, aut rigore, non multum perseverantibus, hæc calor multo flagrantior, & acrior, excipit, quam in legitima.

Horror. Calor.

Pullum habet celerem; urinas biliofas; paroxysmum breuiorem; biliosum vomitum; sitis, atq; vigiliæ, permolestæ sunt; maior corporis iactatio, & inquietudo, adest; quin & interuallum ipsum multo impurius est, adeo, vt etiam postmodum febiles reliquias corpus habere videatur, secus ac in legitima, sub qua spatium inter vnam, & alteram accessionem, medicum sitis abesse, tum appetitus yrgeret, solet.

Pulsus. Urina, &c.

Præcelsere nem febres, aliq; morbi biliosi, & causæ potenter calefacientes, atq; excitantes, quæ scilicet non solum copiosum gignere bilem, sed eandem etiam aduocare, queunt.

Causæ præcedentes.

Pro

De febr. melancholicis

Prognosis,

Hipp. j. Epid. sect. 3. tex. 4. ait quarta-
nam omnium febrium esse securissi-
mam, facillimam, longissimam. Eandem
Hipp. loc. quoque a magnis aliis morbis vindicare.
cui expe- Quod ita accipiendū dicit Galenus, eam,
fuit. si sola sit, nullū nq̄ grauiorem visceris affe-
ctum lequatur, periculo vacare; non autē,
vbi symptomatis rationem subit, & ictericū,
vel intolerabiles lienis obstructions, excipit;
quia n, (vt idem testatur,) saepenumero
videmus, homines ex liene graui quartana
laborasse, ac deinde, collecta aqua inter cutem,
esse derunctos

Cuiusmodi
familiaris
& cui e-
xitialis
esse soleat

Exitialis ferè est senibus, familiarior
30 aut circiter, anni in aetate, 3. Progn.
tex. 28. erraticas conlequitur.

Autumnalis & frequentior, & prodia-
ctior esse consuevit, 2. Aph. 27 3. Aph. 22.

Diuturne
miles hu-
ius febris
quantia.

Non excedere anni spatium inquit
Hipp. j. Epid. cita 0. & Aulic. j. quart. tret. 2.
cap 61. nisi quid erratum fuerit.

Alias ex historiarum monumentis com-
pertum habemus, in plures etiam annos hanc
morbum prorogari.

Vulgi ex
pimo fal-
sa.

Quod vulgo persuasum habetur, nemi-
nem bis quartana prehendi, experientia falsum
esse demonstrat.

Quia

Lib. Caput xix.

65

Quin & illud in confesso est, corpora post hanc febrem plerumq; habiliora fieri, & si per ætatē licet, incrementum sumere.

Viget potissimum ab anno ætatis 25. vsq; ad 45. Quod si extra hoc tempus quartana inuaserit, certò tibi persuadeas, hanc febrem, nisi quid aliud hominem malè habeat, minimè diuturnam fore, ita Hipp. lib. de natura humana sub finem.

Viget ab
anno ætatis 25.
vsq; ad
45.

Curatio.

Indiget morbus iste tum calefacientibus tum aperientibus, incidentibus, abstergentibus, euacuantibus, hac interim animaduersione adhibita, vt quocunq; medicamenti genere utaris, clementioribus ab initio utaris; ne naturæ vim inferas, febrē exasperes, ex simplici duplicem, triplicem, aut pro intermittente continuam, parias.

Quocirca pridie paroxysmi vter blā-
dè mollietur

Castia cum epithymo; aut

Elect. lenituo; vel

Diacatholico, ex aqua boraginis, buglosæ,

sa, cuscute, &c. solutis.

Vbi mauult æger clysterem, is compa-
rabitur ex decocto herbarum emollientium, bo-
rag. buglosæ, fol. senæ, addendo oleum viola-
cæum, randus.

Pridie
paroxys-
mi veni-
ter molli-
endus.

Clyster
ex quibz
herbis
compa-
ratur.

De febr. melancholicis

ceum, florem cassie, mel violarium, saccharum rubrum, salem, oui vitellum.

In copio- Si Sanguis copiosius esse videatur, vno
so sangui ante accessum die, non tantum in prin-
ne vena cipio, sed augmento etiam, morbi, vena am-
secanda. pliori foramine secanda erit, eaque Basilica
sinistri brachij.

Et si sanguis crassior, nigriorque, prode-
at, copiose sinendus est fluere; si verò fla-
uus, ac tenuis, statim supprimi debet.

Prodest etiam liberalior sanguinis mis-
sio ijs, qui sanguine nigro, & crasso, latent.

Hæmorr- Hæmorrhoidum apertio, adhibitis san-
rhoidum guisugis, vel, quod alij, magis placet, scal-
apertio pello facta, adeò utilis est, ut vel sola mor-
prodest, bû quandoque soluerit. Conuenientior quoque
erit ijs, quibus manifestæ, prius fluere solitæ,
iam substitere.

Huc pertinet sectio venæ manus sinis-
træ, quæ medium, & annularem, digitos in-
teriacet, & in ipso interlunij puncto (nisi tem-
pus id in paroxysmum incidat,) facta; nam
sæpe præsentem opem attulit.

Satiùs verò erit, ante hanc venæ secti-
onem, corpus utcumque a melancholico recre-
mento repurgatum esse; quod nihilominus
facto est opus, tametsi phlebotomia præ-
termittatur.

Vacue

Lib. Caput xix.

66

Vacuationem porrò leuiora præparantia anteibunt, vt sunt :

Syrupus acetosus simpl.

Præparantia.

De lupulo,

De fumaria,

De pomis,

De corticibus citri,

Mel ros. simplex, cum aq. vel iure, melissa, boraginis, buglosæ, fumarie, &c.

Neq; totum extra paroxysmum, sed in ipsa accessione, inclinante tamen, hæc prominare licebit.

Purgans conficietur è

rosijs senæ decoctis, vel infusis in sero lactis, vel

Purgantia.

Castia, & manna resoluta decocto communi, in quo præbullierit aliquid senæ, polypodij.

Decoctum epithymi, Mesues. Item,

Castia, & Catholicon cum lapidis lazuli preparati script. j. è iure borag. buglos. viol. senæ, passularum, glycyrrhizæ, &c. indito etiam melle rosato.

Leuiora huius farinæ pharmaca in principio; & augmento, morbi, subinde iteranda sunt, ac proinde compluribus, quod sequitur, egregie proficit:

Leuiora pharmaca in principio & augmento iteranda.

℞. Senæ orient. absq; stipti. vnc. ij.

Radicum gentianæ drach. ij. Tundantur,

Ecc 2

De febr. melancholicis

tur, & conijciantur in vas fictile vitreorum;
affusis vini albi clarissimi, atq; optimi, vnc. x. & c.
Stent per noctem in cineribus calidis. De
liquore hoc excolato dantur vnc. ii. j. cir-
citer, per mensem vnum, & amplius, si mor-
bus fuerit pertinax, pridie paroxysmi quo
tempore purgantia omnia securus exi-
bentur; celsi non deunt, qui ipso die paro-
xysmi talia propinare solent, abarati, quod
res est, contumacem adeo luccum, a natura
iam agitari incipientem, facilius etiam me-
dicamento vacuanti cessurum. Quam cu-
randi rationem, ceu valde efficacem, vt pe-
nitius improbare non possumus, ita longè
securiorem existimamus priorem, nisi vires
robustæ sint admodum, & pharmacum tot
horis ante accessionem oderatur, vt prius-
quàm hæc ingruat, operationem omnem,
vel maiori saltem parte, abioluat.

Quo tem-
pore mor-
bi purgā-
tia offe-
renda.

In mor-
bis diu-
turnis
quid faci-
endum.

Quoniam autem tam in hoc, quàm a-
lijs diuturnis morbis, nocentem materiam
paulatim tum concoquere, tum coctam e-
ducere, est necessarium; inter enumeratas
iam purgationes, febre longius proceden-
te, efficaciores etiam syropos interponere
debet, cuiusmodi sunt:

Syrupus Bizantinus;

De epithymo,

Oxy-

Oxymel compositum, dilutos prius aq.
melissæ, boraginis, cuscute, lupulorum, &c. vel
decocto ceterach, tamaricis, rad. feniculi, cap-
parorum, polypodij, &c.

His ita per dies aliquot continenter Syrupis
assumptis, succedet vel dictorum pharmacorū quæ suc-
aliquod, vel Diacubolicon, Diapena Nicol. cum cedere
lapide lazuli, aut confectione Hamech acutum, debent.
& tum quidem offerre queas Cydonium, aut
pomum sub cineribus assutum, quod fibræ esse
ri nigri prius transfixum fuerat, eximendo
tamen post coctionem veratrum virgulos. Sic
enim post sufficientem materiæ præparati-
onem, quartanarius, & alios pertinaces
morbos patientibus, hyberno tempore ex-
hibitum, breui admodum sanitatem resti-
tuere ait.

Matthiolus lib. 3. epist. 12. suum quen. Ellebori-
dam elleborismum describit, quæ in Com. sing. Mat.
mentario supra Dioscoridem, tanquam re. thiol.
medium, quod vna, & altera vice, bibitum,
quartanas funditus tollat, magnis celebrat
laudibus.

Sunt qui ellebori nigri, in pollinem re. Ellebor
dacti, drach. j. s. vel drach. ij. in sapa vini niger
per noctem macerant; collato, & expresso, quomodo
adijciunt rhabarbari interioris scrup. j. dia-
gydij Gr. ij. vel iij. quæ omnia decocto
Ecc 3 passus

De febr. melancholicis

passillarum, zingiberis, corticum citri, & cinnamomui, diluta, summo mane potanda præbent.

Verùm huiusmodi magno cum impetu, atq; equitatis, purgantia, solatis obstru-
ctionibus circa statum, & declinationem,

Temera- morbi, primùm admittenda sunt. **Tameta-**
ria nec si enim eorum therapeia, qui melancholicis e-
imitanda iusmodi initio statim, vel multò ante vigo-
eorum re, vtuntur, vt subio, vitro, præcipitato, &c.
therape- successu quandoq; haud carent, temeraria
ia qui tamen est, nec facillè prudenti Medico
mochli- inutanda.
cis initio

statim v- Eodem tempore emeticon, è rapha-
tuntur. no ellebori albi radiculis drach. j. pondera-
re confixo, ac per triduum inibi relictis, para-
bitur. perinde verò est vel expressum postea
succum, vel ipsum met raphanum, assumere.

Quomò- Aliqui elleborum in maluatico, vel, vt
ad ali, & Gal. solet, in oxymelle, vnius noctis spatio
quomò- infundunt, eiusq; dilutum propinant, quo
ad Gal. medicamento, paucis præsertim diebus in-
ellebor. tercedentibus, repetito, & hunc, & similes
propinat insuperabiles ferè morbos, aboleri tradit
Petrus Sarius diuersis lib. de affectionibus
particularibus cap. 9.

Eundem effectum præstat oxymel el-
leboratum Gencii.

Cate.

Aët
tibus
præ
tradi
Aph.

dam
gnitu
delib
cuati
tollit
lum
epti,
biles.
ellebo

Succo
conf
parox
locum
ad vo
quo
cos p

hauri
vino
quæ

Cæterum & Hipp. ipse 4. Aph. 13. & Aëtius Tetiab. j. ferm. 3. cap. 120. & lequē-
tibus aliquot, multis ante ellebori vsum
præparationibus, & cautionibus, opus esse
tradit, ne lethalis conuulsio, vt habetur 5.
Aph. j. sequatur.

Nicol. Florentinus vomitorium quod Nicol.
dam suum è radice palmæ Christi, pollicis ma- Flor. vo-
gnitudine, bene pista, generoso quoddam vino mitorii
delibuta, paratum, bis terūc, prægressis va- forte.
cautionibus aliis, propinatū, nunquam ex-
tollit. Verū circa valida hæc inuener-
tum scire conuenit, iis, qui ad vomitum in-
epti, nec naueabundi iunt, & vel alias de-
biles, & emaciati, apparent, haudquaquam
elleborum, aut palmam Christi, exhibenda.

Leuiores vomitoria cætera, ex decocto, vomito-
succoq; raphani, aqua mulla, oxymelle, &c. ris abs-
confecta, quouis morbi tempore, abeunte nate præ-
paroxysmo, antè, vel assumpto iam cibo, roxyfino
locum habent; nisi fortè, veluti monuimus, morbi quouis
ad vomendum omnino ineptus sit ceger; tempore
quo caui Hipp. (4. Aph. 9) melancholici locum
cos plenius per interiora purgare iubet. habent.

Postindie purgationis fortioris vtiliter Postindie
hauriet theriacæ veteris drach. f. aut drach. j. purgati-
vino generoso, aut aronico, diltemperata; omis for-
quæ cæteris etiam diebus, concocta morbi tioris
quid sit-
matee mendum

De febr. melancholicis

materia, salubriter datur.

Modus &
tempus
theriacæ
exhiben-
dæ.

Modum porro, tempusq; vtiliter ad-
ministrandi theriacam, Gal sub finem ca-
pitis 17. libelli de theriaca ad Pisonem, pul-
chrè pertingit his verbis: Ego namq; mul-
tos quartana laborantes, hac ingressus artis semi-
ta, facile à morbo vindicaui. Primum enim, cum
coenassent, et euomerent effeci: deinde secuta die
fecum absinthij bibendum tradidj, quo bilem
contemperarem, ac velut edulcorarem. Postremo,
duabus horis ante inuasionem, antidotum exhibui:
atq; ita cum omni admiratione voti compos euasi;
cum celeriter is, qui theriacam assumpserat, liber
ab inuasionem maneret. Hactenus Gal.

Circa sta-
tum mor-
bi vniuer
salē quæ
expediāt.

Eodem tempore circa statum morbi,
videlicet vniuersalem, expediunt & reliqua
calidiora:

Diatrion pipereon,
Diassoliticum,
Aromat. caryophyl. ex vino forti,
Aurea Alexandrina,

Puluis, aut infus. caryoph. ex aq. vitæ,
vel is ipse puluis, cum cinnamomo, & pipere è
generoso quopiam vino, datus.

Et, quod Gal. libello de rigore & pal-
pit. cap. 7. sibi probatissimum nominat, è
succo Cyrenaico, pipere, myrrha, vel ex hoc, & ca-
storeo, atq; alia huius geueris plura passim
apud

apud
nisi
curab
blem
dican
in co
quæ
æstua

doni
febris
non
rum
tigat
mo
qua
iere
cibu

nis,
Prio
& m

anet

drac
par
co, p

apud Medicos nota: neq; enim hæc febris, nisi corpus eximiè incalescat, vlllo pacto curabilis, quod non ignorauit Arist. j. Problem. 58. qui quartanariis tali victu, & medicamentorum genere, multum velut ignè in corpore accendendum esse asserunt; quæ tamen parciùs calidis siccis naturis, & æstuoso cæli statu, vsurpari debet.

Neq; illud prætereundum, quod Cordoni vòmitio. donius monet, statum, seu vigorem, huius febris, in quo calidioribus hilce locus est, non ex vrinis solùm, sed etiam paroxysmorum tum breuitate, tum symptomatum mitigatione, esse metiendum; quoniam homo parcus cibi, beneq; dormiens, vel in quartanæ principio vrinas concoctas mieri potest, non ob materiam morbi, sed ob cibum ritè elaboratum.

Præterea euocandis sudoribus, & vrinis, sub statum commodè opera dabitur. Sudores Prioris ordinis habentur, præter theriacam, quæ euocant. & mithridatium,

Mulsa, in qua præbullierit calamentum, anethum, aut ruta.

Decoctum item guaiacinum, & myrrhe cl. drach. j ex Maluatico calente hora vna ante paroxysmum, ægro vestibis vndiq; cooperato, propinata: quæ potio ter, eo, quo dictum,

Fff modo,

De febr. melancholicis

modo, repetita, liberat à febre, vt Matthio-
lus refert.

Ad eandem intentionem commendat
radicem angelicæ ex hordei decocto absorptam.
In diuretica locantur:

*Oxymel, syr. de quinq; radic. de hyſſo-
po, &c.*

Quò ſpectant recentiorum ſalia è ſtir-
pium cinere parata: vt, ſal polypodij, chame-
dryos, ſraxini, ceterach, tribus, quatuordecim granis,
ex aqua conuenienti, cuſcute V. G. borraginis,
&c. data: quæ magnæ ſunt energię, ſi hoc
tempore, hoc eſt, circa ſtatum, exhibean-
tur, non autem priùs, quàm notæ coctionis
maniſeſtiſſimè conſpiciantur.

Experimenta, quibus quartanarius cir-
cuitus certò abigi credatur, ſunt varia apud
varios. Cordonius ſuccum calamenthi dat ante
paroxyſmum.

1. Item verbenæ (ſæmine ſcilicet, ita Mat-
thiolus) expreſſus liquor, & vini albi odorati,
ana vnc. ij. tertium ieiuna potione, cuius in
ſeipſo, & alijs, periculum teſtè gloriatur
Arnoldus de Villa noua.

3. Adhæc drach. j. radicis aſari in poſſinem
trite, imminente iam acceſſione ex Matua-
tico, imperato poſtmodum iudore; quod
ſemel, atq; iterum quoq;, faciendum fuerit.

Theriacant

Urinas
ſcientia,

Experi-
menta
quartanæ
abigen-
tia 12,

Lib. Caput xiv.

Theriacam veterem cum aliquot guttis olei vitrioli eodem pacto præbent nonnulli.

Alij cortices aurantiorum ex absinthiaco offerunt, cum accessio iam iam in metu est.

Sunt, qui arcano hoc antidoto tenaces quartanæ vires se infringere gloriantur :

℞. Olei vitrioli ritè apparati guttas vij.

Syr. de cichorio simpl. vnc. ʒ.

de absinthio vnc. ij. s. Misc.

Alexander Benedictus puluerem folliculorum sene ex vnc. iij. decocti absinthij alternatim per aliquot dies offert; simulq; dorſi spinam laurino perungit oleo.

Panis secalinus furno exemptus in aceto maceratur, & destillatur, cuius liquoris, instantante paroxylmo, datur vnc. s. circiter.

Nec desunt, qui diebus xv. cōtinēter dāt succi borraginis depurati drach. iij. è vino Cretico.

Præterea gentiane succus (modo à Dioscoride lib. 3. cap. 3. tradito paratus) castaneæ autē glandis magnitudine; ingruente iam paroxylmo, bis datus, quartanam omnem, etſi grauissimam, sustulit; sed & in alijs quibuscunq; diuturnioribus febribus magno solet esse vsus.

Quò spectat Gesneri, lib. ad parabilia Dioscoridis, antidotus, Saxonica nominata.

Nec contemnendus est pulvis, qui sequitur :

Fff 2

℞ Rad.

70

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

De febr. melancholicis

Rad. gentiana drach. iij.

Calami aromatici,

Baccar. lauri, an. scrup. iij.

Spec. diatrion. pipercon. scrup. iij. f.

Sileris montani scrup. ij.

Rad. filicis scrup. V.

Rad. asari scrup. ij. f. Misc. Vlus

eius est præmissis convenientibus purgationibus ex dialena, vel paris efficaciæ melanagogo drach. j. pōdere ex aq. borrag. V. G. aut vino generoso, instante accessione, & ad sudandum disponente se ægro, datus.

Animi
affectus in
hac febre
multum
præstant.

Multum præterea in hoc genere præstant affectus animi vehementiores, ingens letitia, ira, maximè verò timor, vt quandoq; visi sint quartanam finiuisse. Hinc Rhases ægrum stricto gladio inuadere, & edentulos serpentes in eum coniungere, docet.

Ebrietas
& inglu-
uies sub-
inde hanc
febrim
perfanāt
Peria pra
externa,

Quinetiam ebrietas, ac varij cibi, potusq; licet prauis, magna auiditate, & ingluvie, ingurgitata, hanc febrim subiinde perfanarunt. Causam vide apud Brudum Lusitanum lib. 34. de vict. febr. cap. 18.

Periapta ab auctoribus huc facientia describuntur. Ita apud Diosc. vermiculi in echino dissaci reperti, & araneus alute inclusus, de collo, aut brachio, suspensus, quartanæ circuitus prohibere dicitur, aliq; huius classis

com-

*complura: quæ si quas vires possident, cer-
tè ijs, non nisi therapeia legitima præcunte,
vitimur. vtiliter.*

Interim magna semper in hoc morbo
viscerum habenda est ratio, cordis præser-
tim, ac lienis, sinè cuius vel dyscrasia, vel
pertinaci obstructione, aut humore, quar-
tana nunquam potest esse diuturna.

Cordi præclarè fuerit prospectum,
intus dando. *confectionem diambre, diametschi
dulcis; foris epithemate parato ex aq. borrag.
ros. melisse, spec. cordialib. croco, zedoaria, acce-
to, vino aromatico, &c.*

Ventriculum, & hepar, ijs ferè præsi-
dijs tuebimur, quæ in curatione quotidia-
næ propoluimus.

Lienis obstructiones expediunt deco-
ctum corticum radicum capparis, tamaracis, ce-
terach, absinthij Pontici, chamædryos, adiecto o-
xymelle, quod vicem syrupi præstabit: vel ex-
hibito puluere ceterach, & radicum filicis, cum
vino. Exterius sinistrum hypochondrium fo-
uebitur per spongiam imbutam decoctione rad.
althææ, capparis, fraxini, sem. lini, sanuigraci, per-
fulis aceto, & aqua; ablata spongia, locus
oblinetur amygdalarum amar. oleo, de cappa-
ribus, de spica, cum succo cyclaminis, ammoniaco
ex aceto soluto, ceraq; modica, in formâ vngue-
ti redactis.

Fif 3

Vbi

Cordis &
lienis in
hac febre
magna
ratio ha-
benda.

Lienis
obstructi-
ones ex-
pedientia

De febr. melancholicis

Vbi scirrhus aliquis magis rebellis deprehenditur, qui curationi quartanæ remorari faciat, is profligabitur eo modo, quem suo loco diximus.

Symptomatum omnium quartanæ rigor molestissimus. Rigorem mitigantia.

Inter quartanæ symptomata rigor omnium solet esse molestissimus; qui mitigatur, vbi pannis calentibus extrema foveantur, vel manus, pedesq; calenti aquæ immerguntur, aut æger tempestiuè in molli lecto, ante paroxysmi aduentum, bene contextus collocatur, calidq; lateres vino quospiam aromatico alpersi, linteis inuoluti, pedum plantis, vel manuum, applicati, remouendi mox, cum calor febrilis eruperit.

Vnctio spinæ dorsæ.

Commoda item erit vnctio spinæ dorsæ si hora vna, vel duabus, ante paroxysmum, impositis dein pannis calefactis, tectoq; diligenter ægri corpore.

Litus 4.

℞. Succus rutæ,

Vini Maluat. an. vnc. ij.

Olei scorp. vnc. iij.

Aq. vitæ vnc. j. Coquantur, le-

ge artis, ad succi consumptionem, Fiat linimentum.

Aut quod Vierus deprædicat:

℞. Saluæ,

Rutæ,

Absinthij,

Rori-

Lib. Caput xix.

72

Rorismarini, an. M. s.

Mastiches,

Olibani, an. drach. j. Coquantur

in vini Maluat. & olei oliu. an. cyathovno,
donec liquor ablumatur. Fiat valida expres-
sio; & vtere. Vel:

℞. Aq. vite vnc. s.

Theriace el. vnc. j.

Olei laurini vnc. s. Misce. Vel:

℞. Olei laurini,

Olei ranarum, an. vnc. iij.

Spirit. vini lib. s.

Lumbric. terra num. ix. Bulliant

omnia simul ad spiritus vini consumptio-
nem; coletur.

Trallianus ante paroxysmum, corpo-
re tamen prius bene purgato, multum tri-
buit calidis epithematis,

Per os exhibetur, ante febris inuasio-
nem, ubi refrigeratio tam magna est,

Piperis drach. j. ex aq. ardente;

Vinum aromaticum calens. Vel

℞. Aq. vite vnc. j.

Pulu. caryophyl. scrup. s. Misce.

Frigida nimis, siccantia, viscosa, flatulenta, Viscus
crassa, prorsus deuitare oportet. ratio.

Aërigitur ad calidum, & humidum, de- Aër.
clinet.

De

De febr. melancholicis

Ciborum
prohibi.
torum ca
galegus.

De cibis obest panis fecalinus, malè fermentatus, & pilus: caro bubula, taurina, leporina, ceruina, suilla; carnes sale, aut fumo, induratæ; sanguis animalium, indeq; confecta lagana, seu farcimina, aues quæ in paludibus degunt: vt, anseres, anates, &c; pisces grandiores, dura, & glutinosa, carne præditi; caseus vetus; brassica, leguirina; de fructibus mēpila, sorba, cydonia, & alij fructus adstringentes.

Aquæ potus, veluti leni peculiariter noxijs, prohibetur.

Cibi qui
conces
duntur.

Horum loco conceduntur, quæ sanguinem tenuem, atq; clarum, gignunt. Ex carnibus hædina, agnina, vitulina, veruccina; pulli, capones, auiculæ nemorales; pisces etiam teneri, nequaquam glutinosi succi: vt, funduli, lucij, perca; cappares, velut & cætera salsamenta è lepidio, & sinapi. parata, condimenti more, non alimenti copia, edantur.

Acetum
obest.

Acetum obest; nisi febris à lienis quodpiam affectu soueatur.

Potus.

Potabulum vinum album, tenue, mediocriter calidum: aut eius loco, decoctum piperis, aut cinnamomi; vel huius, & galangæ.

Somnus.

Somnus esto mediocris, velut etiam exerci-

exerci
inh
proli

gato
cedit
supp

facie
mata

seria
proc

stati
fica,
temp
vt di
fana

ILL
fla
dica
Alex

licni

exercitia consueta diebus interualli haud
inhibentur, si paroxysmi neq; violenti, neq;
prolixi, sint nimum.

Balneum aq. dulcis sub tepidum, pur- Balneum
gato iâ corpore, ac morbo inclinante, con- aq. dul-
ceditur; cuius vicem alioquin frictions cis,
supplebunt.

Aluus aperta retineatur, vel cibis huc Alius.
facientibus; vel enematis; quorum paradig-
mata ex superioribus repetere licet.

Curæ, sollicitudo, rerum grauiorum Animi af-
feria paulò magis studia, tristitia, mæror, fœdus.
procul hinc exulent.

His succedant hilaritas, & animi oble-
ctatio, ex amicorû confabulationibus, mus-
sica, &c. Metus nihilominus, atq; iracundia,
tempestiuè, & loco suo, excitata, interdum,
vt diximus, commodant. Hactenus de quare-
sana ex melancholia naturali pendente.

Curatio spuria.

Illi, quæ ex vitione fœcis sanguineæ, aut
flauæ bilis, oritur, tertianæ legitimæ me-
dicationem ritè applicabimus, ita suadente
Alex. Tralliano.

Ac proinde maioribi hepatis, quàm Hic hepa-
lienis, habebitur ratio; atq; operæ precii erit tis maior
cholæ.

De febr. melancholicis

quàm li- cholagogis suprà memoratis aliquid adijce-
re, quod adustos humores vacuare sit na-
benda ra- tum, vt est:

tiq.

Confectio Hamech,

Pil. Indæ,

Pil. de fumaris.

Quando
in hac
febre
theriaca
danda.

Theriacam porrò non dabimus ante-
quàm morbus planissima coctionis indicia
proferat, tumq; eam parciore manu, saccharo
rosaceo, vel alio quopiam eius generis cars-
diaco correctam, dabimus.

C A P V T XX.

De quintanis, sextanis, ali-
jsq; longioris interualli,
febribus.

Ande-
tur quin-
tanæ, sex-
tanæ &c.
dubitant
auctores.

DVbitant auctores (inter quos Galenus,
Campensius, Valesius) vtrum quinta-
nus, septimanus, nonanus, typus, de quibus
Hipp. j. Epid. sect. tex. 2. & 9. peculiare ge-
nus febrium constituent, an recidiuæ quæ-
dam censi debeant. Verùm non delunt
magni Medici, qui id genus periodos ob-
seruârunt. Auicenna j. quarti tract. 2. cap.
67. & Arculanus quintanam, Thomas à
Vei. Com. in 2. de diff. febr. sect. 4. septi-
manam,

manam, & nonanam; Petr. Salius octaua-
nam, & historiam duplicem huius febris
recenset; Gentilis vidit febrem, quæ 15.
quoque die, & quæ semel tantum in anno, e-
xacerbabatur. Quemadmodum etiam de
Antipatro Sidonio referunt Valerius Max.
lib. 3. cap. ult. & Plin. lib. 7. cap. 57. cum
omnibus annis vno tantum die natali febris
citare solitum, & ea febre consumptum esse
satis longa senectâ.

Causa.

Causam istarum febrium plerique tribu-
unt pituitæ paucae, & admodum cras-
sa, quæque naturâ melancholicæ æmuletur.

Signa.

Cognoscitur ex ipso circuitu facillimè.

Prognosis, & curatio.

Prognosis autem, & curatione, à quar-
tana mutuabitur, illa potissimum quæ
apud Arabes phlegmatis perhibetur esse
toboles. Procedet autem cum illis, quæ
corpus vomitu, & deiectione, à superfluis
liberant, aliisque tam medicamentis, quam

Progno-
sis & cur-
ratio à
quartana
petenda.

De febr. melancholicis

alimentis, quæ vim tenuandi, incidendi, abstergendiq; possident.

Quò pertinent, theriaca, & aromatica confectiones: vt diarrhod. arom. ros. Gabrielis, &c.

Thom. à
Ve. quam
causam
harum
februm
statuat.

Cæterùm Thom. à Vei. loco citato, harum februm causam non tam lucco melancholico, aut alteri cuiusq; crasitie, & paucitate, illam referenti, adscribendum putat, quàm ipsimet naturæ, quæ per certa interualla, prout laccelsitur, vitiosum humorẽ, in corpore latentem, aggreditur, quicunq; tandem is fuerit: ac præterea censet eiusmodi periodos rarioribus, & his quæ præter communem cursum, ceu monstri similia, es ueniunt, computandas.

Quisquis igitur propriissima harum februm indicia nosse desiderat, is notas humorum variorum, in corpore excedentium, diligenter consideret; ac deinde pro modo nocentis succi, debita prouideat remedia.

CAP V T XXI.

De febribus compositis.

Febres
variis mo
dis com
ponuntur.

Absolutis ijs, quæ de simplicibus febribus dicenda videbantur, doctrinæ ordo exigit, vt de compositis quoq; paucula in medium adducamus.

Cons

Constat sanè febres multis modis componi, veluti præclare Thomas à Vei. Com. in 2. de diff. febr. sect. 5. parag. Putrescentes te pituita. Vel enim alijs diuersi generis morbis copulantur, inflammationib9 V G. inter quibus, cuiusmodi sunt, quæ pleuritidem, hepatidè, splenitidem, sequuntur; aut quæ viscerū erysipelata excipiunt: vt lippria, typhodes, chynodes, ex erysipelate ventriculi, iecoris, pulmonis.

Febres diuersi generis morbis iunguntur.

Vel talibus iunguntur accidentibus, quæ totam Medici industriam ad se trahunt, quales habentur syncopales appellatæ.

Interdum febres sibi inuicem compllicantur.

Quandoq; sibi inuicem compllicantur, vel eiusdem, vel diuersi, generis, aut speciei, febres: vt, hectica cum putrida; quotidiana cum tertiana; tertiana, & tertiana, ita vt duplicentur, &c. quarum coniugationum differentias singulas scripto complecti, vt infiniti, ita propemodum superuacanei foret laboris. Nam qui simplicium febrium naturam, causas, & curationem, habet perspectam, is compositas quoq; sanandi methodum se nouisse poterit affirmare. Neq; enim aliter febrium compositarum signa, & indicationes, permiscetur, quàm pro ratione causarum, signorumq; componentium.

Qui febres simplices bene curare nouit, is & compositas noscet tollere.

Sic enim vbi vna febris in illa compli-

LIB. Caput xxii.

eratione alteri præpōlet, prænalenti plus o-
penæ impendimus, non neglecta penitus co-
plices.

Prævalen-
ti febri
plus cura
ræ impen-
dendum
Æquales
æquales
curantur

Si pari passu ambulant, & veluti pror-
sus sunt æquales, æqualem vtriq; curam
prestitamus.

Ex compositis igitur febribus, solum
hemitritæum, tanquā notissimum, exempli-
loco, tractabimus. febres enim, quæ inter-
narum inflammationum, & erysipelatum,
sunt comites, non curantur, nisi morbis illis
vnde pendent, abblitis.

Synopales verò febres cum Gal. lib.
iz. luculentè admodum, ac perspicuè, sic
prosequens, operæ precium non est, ut vel
à nobis aliquid adiciatur, vel Galeni verba
huc transcribantur.

CAPUT XXII.

De hemitritæo, aut semi- tertiana.

Galeni
hemitri-
tæ acce-
piones
varie.

GAL. in libello de typis cap. 4. varias he-
mitritæj acceptiones memorat. Alii
quando enim semitertianā generatim no-
minat omnem febrem compositam ex quo-
tidiana & tertiana, siue continuæ sint, seu
intermit-

inter
prop

tritæ
nam
scella
possi
tiana
tertia
lata;
nem
co cit
more
verò
latis,

tex. 2
descri
tinuat
re for
Aph.
sanè r
à Veij
Nani
tæus,
comit
tribus
affirm

intermittentes: aliquando, & magis quidem
proprie, eam continuis annumerat.

Cum autem ad continuitatem hemi- ^{Proprior}
tritæ efficiendam alterutram (quotidiana ^{hemitritæ}
nam dico, aut tertianam, è quatuor ille mi- ^{trita ce-}
scella resultat) continuam esse oporteat; ^{prio.}
possitq; vel quotidiana continua cum ter-
tiana intermittente coalescere, vel e contra,
tertiana continua cum quotidiana interpo-
lata; Galenus priorem febri in copulatione
nem pro legitimo hemitritæ agnoscit lo-
co citato, quæ scilicet ortum ducit ab hu-
more pituitoso in maioribus vasis, bilioso
verò in minoribus, & à corde longius dis-
fatis, putrescente.

Cæterum Hippocrates j. Epid. sect. 3. Hemitri-
tex. 2. hemitritæ nomine non tam febrem ^{thæ Hipp.}
descriptam, quàm tertianam omnem can- ^{pocratia}
tinuam, tertio quoq; die cum aliquo horro- ^{cus.}
re fortiorem fieri solitam, de qua etiam 4.
Aph. 43. intelligere videtur, quod valde
sanè rationum momentis confirmat Thom.
à Veiga loco citato parag. Sed quoniam, &c.
Nam, experientia attestante, talis hemitri-
tæus, non autem Galenicus, prope mortem
comitatur tabidos, & alios è chronicis affe-
ctibus pereuntes, quod de suo hemitritæ
affirmat Hipp. loco citato, quemadmo-
dum

Hemitri-
tæus app.
prope
mortem
comitatur.

De febr. melancholicis

Opinio
vulgi Me-
dicorum.

dum plurimi, citra alium morbum, è sola tertiana continua, quæ tertio semper die horrorem exiguum excitet, moriuntur, quos vulgus Medicorum mori arbitratur è tertiana notha subintrante, hoc est, cuius alter paroxysmus incipiat, priore nondum finito. Atq; hæc ab Hipp. mortalissima censetur; quoniam horror ille significat naturam quidem in singulis accessionibus conari bilem, cuius malitiâ irritatur, è vasis in ambitum corporis propellere; verum in medijs conatibus deficere, id quod febris continuas perleuerans ostendit, atq; hoc pessimum est omen per Aph. 46. sect. 4.

Huius & signa, & curatio eadem est quæ tertianæ continuæ, inter simplicium febrium differentias descriptæ.

Signa.

Signa &
curatio
Gal Hemitritæi.

Signa porrò Galenici hemitritæi sunt: febris cum horrore non solum inuadens, sed in bonam paroxysmi partem producta, qui horrores quamuis remittat, paulò post, ceu noua ingruente accessione, recurrit, (Galenus reduplicationem hunc recursum horroris indigitat) propter illam videlicet quasi luctam humorum contrariorum bilis tenuis,

tenuis, & pituitæ tenacis, quæ impedit, atq; retardat, exclusionem bilis, unde resistat subinde, prodit tamen sudor, aut bilis vomitu, vel secessu, ferme rejicitur alterius solùm diebus, & maximè cum tertiani paroxysmi insultus cum quotidianæ continuæ exacerbatione coincidit. Diebus enim paribus, secundo, quarto, sexto, &c. quando sola quotidiana ægrum exercet, nihil istorum accidit, cæteraq; symptomata sunt remissiora.

Prognosis.

Morbus iste olim Romæ frequens, hodie rariore est, longus alioquin, difficilis, & valde periculosus, nervosas partes, potissimum autem ventriculum offendit, multaq; alia incommoda secum trahit.

Curatio.

F'Ebris hæc, quemadmodum è complexu quotidianæ & tertianæ provenit, ita etiam multis earum auxiliis tractanda venit; id verò cum primis discernendum, vter humor pituitosusne, an biliosus alterum excedat. Nam si bilis copiosior erit, tertianæ dicatis remediis contra morbum pugnabimus;

H h h

si pituita

De febr. melancholicis

pituita vineat, his, quæ in quotidiana recentum, liberalius utemur. Verbo dicā: vniuersa curatio à tertianæ spuræ therapeia parūm discrepat.

Cura à
clysterio
in initio
prespican-
da.

Remedia igitur erunt in initio lene clysterium, aut eccoprocticon aliquod blande: deinde phlebotomia; postea /rupi, aut apozemata, quæ tum bilem attemperant, tum pituitā apparant, ut sunt:

Syrupus de duab. rad.

Bizantinus,

De hyssopo,

Oxym. comp.

Syrupus acetosus,

De cicchorio cum rhab.

De acetos. citri. &c.

Post notas coctionis conspicuas, dilutum, vel decoctum, ablinthij Pontici, recte præbebitur; deinceps purgantia conueniunt,

Rhabarbarum V. G. cum agar,

Elect. diaphænicon,

De psyllio,

Diatribib, cum rhab. & rad. mechoaca puluerata.

Ad extremum viscera coctioni seruientia roboranda

Trochiscis de rhab,

De ab

Lib. Caput xxii.

78

De absinthio,

Diarrhodon Abbatis,

Diatrion santalon, addendo duplum,
triplumque, rhabarbari.

Ratio victus eodem spectare debet, victus
quò pharmaca cætera, nempe, ut aer sit, ratio.
temperatus, cibi facilis concoctionis, & vi refri-
gerandi, atq; abstergerendi, præditi; qualis est pit-
jana, aliq; ex hordeo parata edulia.

Potus esto:

Potus.

Decoctum hordei,

Glycyrrhizæ,

Pasularum,

Sem. anis. &

Cinnam. Hæc

verò ipsa nequaquam offerri debent, nisi
in vera febris remissione, & ubi ea venit,
protinus danda sunt

Monet deniq; Cern. Cels. lib. 3. cap. 8.
intempestiva cibatione plurimos in hoc
morbi genere pessundari.

Somnus, vigiliæ, exercitationes cor-
poris, ubi per vires licet, animi pathemas-
ta, omnia ad moderationem spectare de-
bent.

Quintus Serenus cæteris periaptis hanc Periapta.
præfert schedam, collo appeniam, in qua
scriptum sit verbum:

H h h 2

Abra-

De abs

De febr. melancholicis

Abracadabra,

Abracadabr,

Abracadab,

Abracada,

Abracad,

Abraca,

Abrac,

Abra,

Abr,

Ab,

A.

Hactenus in vniuersum de febris hu-
moralibus.

C A P V T XXIII.

De febre hectica.

Hectica
febris
quid,

HECTICA febris tum dicitur, cum calor
præter naturam in solida cordis substan-
tia accenditur; constituitq; tertium, & sum-
mum, febriū genus; de quo (expeditis iam
duobus alijs, quorū vnum in spiritibus cor-
dis, alterum in eiusdem humoribus calefa-
ctis, versatur) in præsentia nobis agendum
restat.

Est autem solidæ substantiæ non vna,
& simplex, significatio. Quandoq; enim per
solidum, latè loquendo, intelligimus, quic-
quid

quid à spiritu, & humore, seu actum in partibus corporis numeratur: ita caro simul & adeps appellantur solida: aliquando ac proprie, veluti etiam hoc loco, per solidas partes spermaticas oportet inaudire. Sic Thom. à Vel. Com. in j. de diff. febr. cap. 8. lect. 4. par. Generantur igitur. &c.

Calor is in cordi. substantia defixus, humilitatem in solidis subsistentem, calq; proximè nutrientem (Gal. 7. Meth. cap. 6. rorē appellat) vel tantum accendit, & ebullire facit; vel insuper depascit, atq; imminuit; vel iam omnem consumpsit, ut nihil eius super sit amplius. Vnde tres hecticae veluti gradus, aut differentiae, resultant. Prima simplex nominatur hectica; postrema torrida, seu, consummata; secunda medio inter utramq; collocatur loco, & magnam patitur latitudinem pro maiori vel minori humiditatis illius consumptione.

Causa.

Febri hectica vix unquā hominem primò, ac per se, inuadit, agnoscitq; causas impensè calefacientes, & exsiccantes, ac subiectum valde ad id dispositum; ferèq; tē-

H h h 3

per

De febre hectica

per excipit vel diarias, ex ira, mærore, inedia, diutius perseverantibus, vel putridas & ardentes, præposterè curatas; vel internorum viscerum calidam siccamq; intemperiem, aut inflammationes suppuratas, vlcera, atq; corruptelas. Quinetiam à quibusdam venenis, aut medicamentis venenatis, propagatur.

In hac febre cor interdū primario tenetur affectu, interdū alijs visceribus consentit, ro. Meth. cap. 8. Plurimæ enim sunt partes siue calida siccaq; intemperie, seu inflammationibus, aut totius substantiæ corruptione, laborent, quæ cordi dein fixum illum calorem imprimunt, vt ventriculus, hepar, pulmo, pectus, mesenterium, intestinum iciumum, colon, uterus, renes, septū transversum, ex quo tamen prius mors, quàm hectica, occupat.

Signa.

Signa hectica. Signa hectica sunt: calor ad primum affectum blandus, perseveranti tamen tactui acer, atq; mordax, & squalorem, seu ariditatem, præferens, quem nihilominus æger, propter æqualem totius intemperiem, cordi consentientem, haud percipiat.

Is ipse

Is ipse calor multò manifestiùs in pul-
pis digitorum, volis manuum, pedum plan-
tis, percipitur.

Proprium verò, & inseparabile, indi-
cium hæcticæ est, quòd febrilis calor, licet
alioquin semper æqualis, sibiq; similis, ho-
ra tamen vna, & altera, post assumptum ci-
bum, quodocunq; tandem is cesseratur,
manifestè augeſcat, & emicet, verùm sine
annotatione, quemadmodùm in putridis ve-
lueuit, hoc est, sine prægresso horore, fri-
gore, rigore, pandiculatione, &c. & quòd
talis constanter perseueret, donec plena a-
limoniæ distributio fuerit facta, quod Gal.
eodem modo contingere arbitrat, quem-
admodùm calx viua ab aquæ conspersio-
ne exardeſcit, bullitq;.

Pulsus hæcticarum est debilis, paruus, Pulsus,
durus, frequens; à cibo tamen, vnà cum
ipſo calore, per aliquot horas increſcit, &
maior fit, atq; velocior.

Quin & arteria ipſa magis calet, quàm Arteria
partes circumſtantes. calet.

Ab vrinis nullum hæcticarum ſignum Vrinæ,
deſumitur.

Adhæc, diaria, quæ vltra 24 horas pro-
ducitur, hæcticæ gignit ſuſpicionem.

Alterà, maraſmodes appellata, faciliè de- Maraf-
prehens- modes.

De febre hectica

prehenditur ex facie Hippocratica, vnguini curuitate, & quod ager quodammodo viuum sceleton appareat, hoc est, nihil præter ossa, cuiusq; ostendat, quæ digitis appressa, pellis siccae modo, consistit, & riget.

Prognosis.

IN hecticam propensiores sunt naturæ calidæ siccae, & vehementius, graciles, & pauci sanguinis, homines.

Hectica simplex, seu, primæ speciei, minori labore curatur, quàm cognoscitur: marasmodos contra, vel tertæ speciei hectica, præfusus est insanabilis; media, prout huic, aut illi, proprius accedit, aliquando sanatu facilior, aliquando difficilior, euadit.

Mortis
præfagi-
um.

Mortis iam iam imminuentis præfagium est, alui illuxus superueniens, siue colliquæstruus, seu prostratæ virtutis naturalis affectio.

Curatio.

Scopi cu-
rationis.

SCopi curationis in hectica, quæ sola, sine alterius morbi complexu, subsistit (nā quæ vel putridam febrem, vel vlcus pulmonis, vt in phthisi coniuncta habet, non tollitur, nisi affectibus illis prius abolitis) quoniam

niam causam fouentem non habet, estq; in-
temperies calida; sunt refrigeratio, & hu-
meſtatio, non ſolùm per ea, quæ qualitate
humefaciunt, ſed & quæ ſubſtantificam hu-
miditatem procurant, & eam deperditam
reſtaurant, quod ea tantùm efficiunt, quæ
corpus bene nutriunt.

Porro cùm refrigeratio, ceu quæ per effi-
caciffimam, aut (vt loquuntur Scholæ) acti-
uam, qualitatem introducatur, breui admo-
dùm perficiatur, periculo tamẽ haud vacat,
in corporibus præſertim excarnibus, qua-
lia hecticorum, ex alijs morbis huc deuolu-
torum, eſſe conſueuerunt. Moderanda igitur
erit, & magis indiſtriã humeſtationi in-
cumbendum, vtpote cuius actio ignaua eſt,
& in qua modum excedere non poſſis.

Materia curatiuis intentionibus ido. Curatio.
nea partim intus, partim foris, corpori oc-
currit.

Intus quidem aër inſpirando attractus,
& ea, quæ cibo, potuq; , reſciunt: foris verò
circumſuſus aër, & præſidia topica, refrigerantia,
humeſtantia: vt, aquæ dulcis balneum. &c. De
ſingulis ſeorſim.

Aër ſit frigidiffimus, vel talis arte pares Aër.
tur, eo pacto, quo in febre ardente appa-
randum docuimus; ita tamen, vt is respira-

De febre hectica

tioni quidem inferuiat, reliquum verò corpus minimè feriat, quod proinde stragulis bene tectura, & vndiquaq; munitum, esse debet. Hyeme oportet eum quadamtenus calefacere vapore aque calentis.

- Cibus.** Cibus præbeatur boni succi, non facile dissipabilis, neq; etià concoctu difficilis. Talis est vel sponte sua, seu, propria natura, vel præparatione euadit talis: vt, pullus, capus, pipio, nephrens; hedi-
Carnes. na, agnina, vitulina, veruccina; horum animalium pedes; paruus cuniculus, lepus iuuenis; tene-
Pisces. riores aues; oua sorbilia; lac, de cuius vsu infra pluribus; pisces saxatiles, & qui ab horum bonitate proximè absunt; trochta, anguille; in aquis salubribus captae, & bene preparatae; hepata item piscium; testudo nemoralis, cochlea gambari, cancri, & ranarum coxae.

Frumentacea. Ex frumentaceis cremor hordei commen-
datur.

Olera. Ex oleribus, endiuiia, lactuca, spinachia, malua, portulaca, borrago, buglossum.

Fructus. Ex fructibus, poma dulcia, cucurbita, cucumeres, amygdale dulces recentes, & nuclei pini eiusdem ætatis, si prius noctem vnā in aqua violarum macerentur.

Nota. Notandum tamen interim, ea quæ in isto catalogo durioris sunt consistentiæ, inter initia morbi, cum vis concoctrix etiam
num

num valet, offerenda esse, reliqua postea-
rius.

Elix. cum suo iure absumentur; unde
Hippocrati meritò assatis, ceu promptè
bilescitibus, præferuntur.

Salis verò quàm minimum edulia o-
mnia habeant. Sal.

Condimentum cibo, ceteris aromatis o-
mnibus abdicatis, pariter ex croco, vel
succo citri, aut limonum carnibus, inspersum. Condi-
menta.

Cum carnibus porro perpetuò aliquid Carnibus
elixetur, quod alteret, & (si videatur ne incoquē-
cessarium) alimentum reddat stabilius, cu-
iusmodi censentur: prædictorum olerum ali-
quod, hordeum, particula porcelli, pes vituli-
nus.

Ex eadem materia fiet gelatina, vel Gelatina.
hæc ipsa, quemadmodum etiam interiora
carnis absatæ, succi adhuc plenæ, prælo
subijci queunt, indeq; profluens liquor præ-
beri, aut, quod consummatum vocant, con- Consum-
fici, deq; eo vnum, aut alterum, cochlear mata.
cæteris fereulis permisceri potest.

Sunt qui hæc ipsa in B. M. destillant, Destillata
gustui quidem non minùs iucunda, viribus
autem multò inferiora.

Suaue, & utile, edulium componitur è
iure pulli, cum emulsione quatuor sem. frigido.

De febre hectica

rum maiorum, & saccharo: aut hordeum ad molitiem discoctum, cum vitello oui, vel cancri bene præparati, mundatiq; cum cremore hordei, amygdalis, & saccharo.

Cancro-
rum &

Constitit verò cancorum, & gamarorum, præparatio in eo, ut abiectis testis, cherum prælis, & pedibus, cum lixiuio, atq; cinere, ad paratio. emendandam odoris fæditatem bene fricentur, cum aqua limpida aliquoties abluantur, ac tandem in iure gallinæ, aut simili, elixentur.

Cochlea-
rum præ
paratio.

Cochleæ verò ita parantur: Coquuntur in aqua, & lixiuio, parùm salis, dein ablutæ ex aqua, vel hordeato, vel pulli iuscullo, ad molitiem denuo percoquantur. Verumenimverò præstat tam cochlearum, quàm gambarorum, aliorumq; huius generis, expressum succum usurpare, quàm carnes edere.

Oua.

Quo respicientes aliqui, pullos offerunt, carne gambarorum, aut cochlearum, cum tritico, & hordeo, prius elixâ, nutritos.

Oryza.

Oua item iorbilia multum conducunt, vbi, salis vice, saccharo consperguntur.

Panis tri-
ticeus.

Plurimum quoq; nutrit oryza, cum iure caponis parata, ac pullicula ex amylo, & lacte amygdalarum.

Adhæc panis triticeus ex aqua aliquoties ablu-

es ablutus, & expressus, ac postea cum iure pulli, capite, adiecta sem. frig. maiorum emulsione, & saccharo, percoctus. Vel, si is ipse lacti recens multo, citra aliam cocturam, infusus solus edatur.

Cæterum quamvis hectici, ob multam corporis resolutionem, copioso cibo indigeant; quia tamen calor ipsorum debilis nequit illum euincere, consultum est partitis vicibus parum aliquid offerre, & alii non e multitudinē frequentia compensare. Singulis igitur quatuor horis, & semel etiā de nocte, aliquid præbebitur; nā vitanda hecticis est modis omnibus tam fames, quam sitis.

Potus erit aqua, vel feruefacta solum, vel quæ aliquid sacchari adiectum habeat, vel in qua bullierit hordeum ad rubedinem usq; vel deniq; in magna virium, & ventriculi, imbecillitate vinum album, tenue, olygophorum, aqua probè dilutum, aut fontana, aut buglossæ, aut nymphææ.

Vbi alius profluentior est, aqua hordei, & milij torrefactorū cū gummi Arabico propinabimur.

Inter ea quæ per os dantur, præter recensita edulia, primas meretur lac, quod manè ab vbere calens protinus hauriri debet. Præfertur autem alijs in hoc genere (teste Gal. Meth. 12. & 7. lib. cap. 6.) hu-

De febre hectica

Signator
retrahat
coaguli
in ventri-
culo la-
ctis.
Coagula-
tionem
lactis
quid im-
pediat.

Ptisana.

Aqua stil-
lat limas
cum.
Electua-
ria, &
condita.

manum lac, mulieris sanæ, boni habitus,
duobus circiter mensibus à partu distantis;
deinde alinum, post caprinum, postre-
mo loco vaccinum, dempto iam butyro.
Dosis ab vnc. ij. ad lib. f. & lib. j. dummo-
do in ventriculo non coaguletur, aut cor-
rumpatur, velut innotescit ex iuctu acido,
fatido, amaritudine oris, febris, ac titis, in-
cremento, pulsu maiore, celeriore, & lotio
coloratione.

Coagulationem porrò lactis in stomas-
cho impedit tantillum sacchari adiectum.

Præsentem autem diarrhæa minimè ex-
hibendum est lac, nisi prius ignitis filicibus
vstulatum.

Cæterum ab assumpto lacte neq; in-
dormiendum, neq; alius vel cibus, vel po-
tus, quatuor horarum spatio ingerendus.

Iis porrò, qui per Aph. 64. sect. 5. ab
usu lactis arcentur, commodum præbebis
mus ptisanam ex iure pulli per se, aut elixatis in
eo prius preparatis cancris. Quantitas eius est
vnc. v. cum vnc. f. syr. viol.

Aliqui celebrant aquam stillatitiam limas-
cum, cum eiusmodi quopiam syrupo datam.

Electuaria, condita, aliaq; instaurantium
medicamentorum formulas, de industria hic,
ceu passim apud auctores obuias, silentio
inuoluimus.

De ijs,

Lib. Caput xxiii.

85

De ijs, quæ forinsecus adhibentur, hu. Balneum
 mestantibus, refrigerantibus, præfidiis, Ga-
 lenus balneo plurimum tribuit lib. 10 Meth.
 cap. 10. Si tamen absint, quæ illius vsum in-
 hibere possunt: vt, inflammatio interna,
 aut visceris alicuius præstantioris insigni-
 ordebilitas, alui fluxus, cruditas, & febris
 putrida. Erit autem id è dulci aqua com-
 paratum, calidiusculum, non vsq; adeò ta-
 men, vt sudorem proliciat. Trallianus 12.
 lib cap. 4. lactis more, tepentem balnei a-
 quam exigit, cui paulatim affundenda est
 frigida, aut eovsq; illic desidendum, donec
 sponte sua refrigeretur. Poterit autem, vbi
 vires consentiunt, bis die adhiberi, sed, ante
 balnei ingressum tribus, quatuorue, horis
 aliquid cibi coctu facilioris æger delibau-
 rit oportet, ne animo linquat. Sunt qui a-
 quæ balneo destinatæ incoquunt lactucam,
 violariam, nymphæam, caput, & pedes ari-
 etinos; vitulinos.

Postquam balneare desijt, vngetur
 cundum spinam, & pectus maxime, oleo
 violarum, & amygdalarum dulcium, buty-
 rone recenti. Aut:

℞. Ol. amygd. dulc. vel communis recentis,
 non saliti, lib. iij.

Vini albi dulcis lib. f.

Vnguentum.

Aque

De febre hectica

Aque simplicis q. s. Infundantur

Foliorum lactuce;

Maluæ, an. M. j.

Violarum M. ss.

Rosarum recent. vel earum quæ post de-

stillationem supersunt. P. ij. Co-

quantur in vase duplici ad exhalationē vi-
ni, & aquæ, quod reliquum est exprimatur.
Hoc vngvine illinantur molliter partes pri-
mum infernæ, mox & supernæ.

Ad cætera topica quod atinet, cogni-
tum prius habere oportet locum primò af-
fectum, seu, à quo hectica, vt fonte, propa-
gatur: non enim semper à corde ipso inci-
pit, licet cor necessario afficiatur, vt dictū
fuit. Illi igitur parti, quæ cor in sympathiam
pertrahit, suaq; calidiori dyscrasia febris hu-
ic occasione præbet, siue sit ventriculus,
siue hepar, &c. ea applicabimus, quæ ardo-
rem, squaloremq; attemperant, cuius ge-
neris reputantur: Vng. refriger. Galeni, farina
iunctæ hordei, succo portulicæ, lactucæ, aut sem-
peruini in horis, in cataplasmatibus formam reda-
cta, quæ subinde vbi incaluerit scilicet, per-
mutare conuenit.

Epithe-
mata;

Huc etiam reuocari merentur epithe-
mata in tractatione febris ardentis propo-
sita; sed acetum est omittendum.

Præ-

Lib. Caput xxiii.

85

Præparantia, purgantia, venæ sectio,
nullum in hoc morbi genere locum ha-
bent. Opportuni tamen sunt chysteres parati
ex solo lacte caprino, aut optimo iure carnis;
vel cremore hordei cum vnc. iij. iij. flor. cæsie
in adstrictione alui: vel componuntur etiā
e butyro rec. nucilaginis cydoniorum, iusculo
caponis, aut decocto lactuca, violaria, vitello oui,
& saccharo.


Somnus indulgetur bene longus.


Animus esto tranquillius, & moderato
doq; perfundatur gaudio, omnes alios
graviore affectus fugiendo.

Corpori quoq; ab exercitatione vaca-
tio, & quies, adeo est necessaria, vt Gal. lo-
co citato malit ægrum in balneum depor-
tari, quàm eò pedibus descendere. Hæc
de febre hectica, alijsq; tam simplicibus,
quàm conpositis, febribus, ad Omnipoten-
tis Dei immortalem gloriam dicta

sint satis.

Kkk







Errata corrige.

Fol. 30. Pro calore tincta est, lege colore &c.

Fol. 49. Is igitur instaurandis, lege Iis
igitur &c.

Fol. 67. Petrus Sarius, lege Petrus Salius.

Cætera, si quæ reperientur, tanquã
leuia, facile lectio ipsa emendabit.



ore &c
lege lis

ore &c
lege lis

Salus.
anqua


ore &c
lege lis


2025 07 05

2025 07 05

2025 07 05

2025 07 05







Pingere Rens
R. Placitum Manilorum My
Et bene bene in ambo
suis Voz erit resurrectio
carnis Sic sudorem facies
et laus eris

Recipe

~~Stercoris Canis~~
~~medicamentum~~

Recipe
R. elgatus

R.

Ex abate. datus. datus.
Kingo. Episcopus.

Inaite sine matre me
ra sine matre. gendit
pater et pater
uxorem et uxorem
gendit uxorem
mei

Biblioteka Jagiellońska



stdr0025649

